

Es fácil

Porcilis PCV M Hyo no solo aporta la comodidad de un producto listo para usar contra el circovirus porcino tipo 2 (PCV-2) y *Mycoplasma hyopneumoniae* (M. hyo), sino también la flexibilidad de su uso concomitante o combinado con otras vacunas.

MSD Salud Animal


Los resultados mostrados a lo largo de este documento son consecuencia de las observaciones en ensayos de laboratorio y de campo y no constituyen necesariamente una indicación oficial para el producto en cuestión.

Comodidad y protección en un frasco

En el mercado hay disponibles vacunas frente a PCV-2 y M. hyo y se usan rutinariamente en la industria porcina. Sin embargo, su administración por separado puede requerir la mezcla de componentes antes de la vacunación o realizar múltiples inyecciones, con el consiguiente aumento de manipulación y estrés asociado.

Además, hay que considerar los factores que afectan a la administración de vacunas por separado, como la competencia entre antígenos y la interferencia o compatibilidad entre vacunas.

Porcilis® PCV M Hyo, la primera vacuna de PCV y M. hyo de dosis única lista para usar, es la respuesta de MSD Salud Animal a estas preguntas.



- Dos antígenos en uno: doble protección en una sola vacuna.
- Sin mezcla: elimina la posibilidad de mezclar incorrectamente los antígenos.
- Una dosis fija fácil de recordar: dosis de 2 ml.
- Buena jeringabilidad.
- Más rentable, basado en el tiempo de vacunación y la reducción del manejo.

En comparación con los tratamientos tradicionales con antibióticos y antimicrobianos, que requieren ser añadidos al agua o al pienso, la vía de administración directa de la vacuna asegura que se garantice la dosis correcta por animal.

Los anticuerpos maternos (AM) no afectan a la eficacia de Porcilis® PCV M Hyo

El programa de vacunación de dos dosis se recomienda cuando las infecciones por M. hyo ocurren en etapas tempranas en la granja, ya que los AM no afectan a la eficacia de Porcilis® PCV M Hyo incluso en edades tan tempranas.

Sin embargo, el uso de rutina de Porcilis® PCV M Hyo es un programa de vacunación de dosis única.

Por último, Porcilis® PCV M Hyo contiene Emunade®, un adyuvante de aceite en agua que ayuda a estimular la respuesta inmunitaria tras la vacunación con una aparición rara (o muy rara) de reacciones adversas, que generalmente son mínimas o leves.

Toda esta protección en una dosis fija lista para usar, con una sola inyección desde las 3 semanas de edad, incluso en presencia de elevados niveles de AM.

Programa de vacunación de dosis única

Una sola dosis intramuscular de 2 ml de Porcilis® PCV M Hyo se puede administrar a partir de las 3 semanas de edad sin que su eficacia se vea afectada por la presencia de AM, por lo tanto, reduce:

- La viremia.
- La carga de virus en los pulmones y en los tejidos linfoides y la diseminación del virus a causa de la infección por PCV-2.
- La gravedad de las lesiones en los pulmones causadas por M. hyo.
- La pérdida de la ganancia media diaria (GMD) durante el periodo de finalización causada por la infección por PCV-2 y/o M. hyo.

Reacciones adversas mínimas o nulas

Los resultados han demostrado que en más de 1 pero menos de 10 animales de cada 1.000 animales que recibieron una vacuna con Emunade®, las reacciones transitorias en el lugar de inyección se limitaron a inflamaciones menores de 2 cm de diámetro y desaparecieron a los 12 días de la vacunación. Los aumentos leves de la temperatura corporal tras la vacunación volvieron a la normalidad entre 1 y 2 días después de la vacunación.



