

FICHA TÉCNICA

Axilur® PI Inyectable Antiparasitario interno para bovinos. Listo para usar.

Composición:

Ricobendazol (*):15,00 g.
Agentes de formulación c.s.p.:100 ml.
[5-(propilsulfinil) 1H-Benzimidazol-2-1] Carbamato

Indicaciones de uso:

Axilur® PI Inyectable es un antiparasitario interno de triple acción (adultos, larvas y huevos) contra nematodos gastrointestinales, especialmente de los géneros *Haemonchus spp*, *Ostertagia spp* (inclusive L4 inhibida), *Trichostrongylus spp*, *Cooperia spp* y *Oesophagostomum sp*, y Pulmonares del género: *Dictyocaulus spp*.

Forma de Administración y dosis:

Administrar por inyección subcutánea. La dosis es de 1 ml cada 40 kg de peso vivo (3,75 mg de Ricobendazole/kg p.v.).

Para el tratamiento de Ostertagia inhibida la dosis recomendada es de 1 ml cada 20 kg de peso (7,5 mg Ricobendazole/kg p.v.).

Período de retiro:

No enviar animales a faena para consumo humano hasta los 28 días después del último tratamiento. No destinar a consumo o industria la leche proveniente de los 3 días después del último tratamiento.

No utilizar durante los primeros 45 días de gestación o hasta 45 días después de haber retirado los toros.

Almacenamiento:

Conservar el producto en lugar seco y fresco evitando la luz solar directa, a temperatura entre 5 y 25 °C. Destruir los envases vacíos.

Presentación:

Envase de 1 litro.

Elaborado en Uruguay

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

senasa

Extensión de Certificado N° 02-102

Comercializado y distribuido:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Diretor Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.

FICHA TÉCNICA
