

FICHA TÉCNICA

Butox® Garrapaticida Bovino

Antiparasitario externo piretroide, garrapaticida, piojicida, insecticida, preventivo de URA, control de Mosca de los Cuernos.

Fórmula:

Indicación:

Antiparasitario externo, Garrapaticida, Piojicida, Insecticida, Preventivo de URA, Control de Mosca de los Cuernos.

ATENCION: ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES

Administración: Baños por inmersión.

Dosificación: Pie de baño: 1 litro de Butox® en 1.000 litros de agua.

Reposición y Refuerzo: Cuando por el pasaje de animales el nivel del baño haya bajado un 10% de su volumen inicial, agregar 1,5 litros de Butox[®] cada 1.000 litros de agua, o de acuerdo a las siguientes proporciones.

Agua en litros	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Butox® en cm ³	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500

Si por cualquier razón no se dispone de agua para reponer en la forma indicada, para poder seguir bañando animales se debe realizar un refuerzo en seco de 0,5 litros de Butox® cada 1000 litros que haya disminuido el nivel del baño. En caso de entrar agua en el bañadero (Iluvias u otro factor) deberá agregarse Butox® en las proporciones correspondientes a Reposición y Refuerzo

Frecuencia entre baños: Para limpieza dar dos baños con intervalo de nueve a doce días. Baños generales: Bañar con un intervalo mínimo de treinta y siete días y máximo acorde a la recomendación del veterinario interviniente. En zonas de lucha activa contra la garrapata bañar según lo establezca el Servicio Nacional de Sanidad Animal.

Recomendaciones generales: Agitar bien el líquido de baño antes de comenzar a bañar y después de cada reposición. No bañar animales cansados ni en horas de excesivo calor o frío. Nunca permitir que los animales beban el líquido de baño. Preparar el líquido de baño acorde con las dosis indicadas. Hacer una premezcla con la cantidad necesaria de Butox® en 5 litros de agua, volcar esta premezcla a lo largo del bañadero con la cantidad de agua que corresponda





FICHA TÉCNICA

Restricciones de uso: Dejar pasar un período de 3 días entre el último tratamiento y el sacrificio de los animales destinados a consumo humano. No hay restricciones para el uso de la leche de los animales tratados.

Precauciones:

Usar con cuidado, evitar la ingestión, la inhalación y la contaminación de alimentos y bebidas, lavar con abundante agua las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No fumar o comer durante su uso. No contaminar cursos de agua (tóxico para peces). En caso de ingestión no provoque el vómito y administre carbón activado. Síntomas de intoxicación en el hombre: salivación profusa, excitación, tremor, miosis y eventualmente, convulsiones. Evite el enfriamiento y consulte a su médico urgente. Tratamiento recomendado: Diazepam en caso de convulsiones y Atropina en caso de hipercolinergia.

Consultas en caso de intoxicación:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160

Producto Inflamable

Conservar en lugar fresco y a la sombra entre 2° y 40°C

Garantía: Se garantiza la alta calidad de este producto y su estabilidad hasta la fecha de vencimiento indicada. Dado que el mismo será utilizado en condiciones que escapan al control del elaborador, éste no se responsabiliza de los daños o perjuicios que deriven del uso distinto al recomendado en este rótulo.

Precinto de garantía: Este producto debe ser entregado con el precinto de garantía.

Período de retiro:

Dejar pasar un período de 3 días entre el último tratamiento y el sacrificio de los animales destinados a consumo humano. No hay restricciones para el uso de la leche de los animales tratados.

Almacenamiento:

Conservar en lugar fresco y a la sombra entre 2° y 40°C.

Presentación:

Envase de 5 litros.

Industria Argentina

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. Mantener fuera del alcance de los niños. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

senasa

Certificado N° 1.627 Producto elaborado en: Estab. Hab. N°8024

Comercializado y distribuido: Intervet Argentina S.A.





FICHA TÉCNICA

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, Méd. Vet. MPBA 4505.

