

FICHA TÉCNICA

Bykahepar® Clanobutina

Estimulador inmediato de la actividad secretora hepática, gástrica y pancreática.

Composición:

1 ml de solución inyectable contiene Clanobutina sódica 106,4 mg, equivalente a 100 mg de Clanobutina base.

MECANISMOS DE ACCIÓN: La inyección parenteral de este preparado estimula la secreción exocrina de las glándulas digestivas. La secreción y excreción de bilis, pepsina, tripsina, quimotripsina y alfa amilasa son notablemente incrementadas. Este efecto se inicia de inmediato tras la inyección, llega a su máximo en aproximadamente 2 horas y dura 10 horas.

TOXICIDAD: La LD₅₀ por vía endovenosa en lauchas es de 574 mg/kg/pv.; la LD₅₀ oral en ratas excede los 2 g/kg/pv. La dosis terapéutica de BYKAHEPAR* es de 10-20 mg/kg/pv. El producto ofrece, por tanto, un amplio margen terapéutico de seguridad tras aplicaciones simples o repetidas. BYKAHEPAR* es bien tolerado sin provocar reacciones locales o generales luego de aplicaciones endovenosas o intramusculares.

Indicaciones:

Tratamiento de las disfunciones digestivas sensibles al estímulo de las secreciones gastro-enterales exógenas.

• RUMIANTES

Indigestiones primarias: Como resultado de la sobrealimentación, especialmente con carbohidratos altamente digeribles (acidosis ruminal). Alimentación con raciones contaminadas o en mal estado (disfunción en la flora del rumen). Cambios bruscos en la dieta. Sobrecarga ruminal. Timpanismo. Indigestiones secundarias: Resolución de paresias ruminales provocadas por convalecencia de enfermedades, cirugía, intoxicaciones o desórdenes metabólicos, tales como acetonemia en vacas o toxemia de la preñez en ovejas.

Constipación: Estímulo de la función hepática mediante el estímulo de la secreción biliar.

• CERDOS

Falta de apetito, constipación, especialmente en cerdas preñadas o lactantes; indigestión de diversos orígenes, intoxicaciones alimentarias, enteritis (complemento de terapia antibiótica).

• CABALLOS

Falta de apetito, disturbios digestivos debidos a sobrealimentación de concentrados, constipación, atonía intestinal, cólico gaseoso, intoxicación alimenticia, hepatitis.

• PERROS

Falta de apetito, desórdenes digestivos, constipación rectal, complemento en tratamiento de la atonía intestinal, disfunción pancreática, hepatitis.

CONTRAINDICACIONES: Desconocidas.

FICHA TÉCNICA

DOSIS Y ADMINISTRACION:

General	1-2 ml cada 10 kg/pv.
Vacunos	20-40 ml IM-EV
Equinos	20-30 ml EV
Terneros	5-15 ml IM-EV
Ovejas-Cabras	5-6 ml IM
Cerdos	10-20 ml IM-SC
Perros	2-8ml IM

Repetir según el curso de la enfermedad, con media dosis a las 12 horas o con dosis completa a las 24 horas.
Restricción al consumo: Debe descartarse para el consumo humano o industrialización la carne y/o leche de animales tratados con este producto, hasta 24 horas después del tratamiento.

PRESENTACIÓN: Frasco-ampolla de 100ml.

Elaborado en: Francia

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

 **senasa**

Certificado N° 88.316

Comercializado y distribuido:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.