

FICHA TÉCNICA

Cacique® Antiparasitario externo. Curabicheras

Composición:

Cipermetrina.....	3,0g
(RS)- α -ciano-3-fenoxibencil(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2dimetilciclopropancarboxilato	
Ácido salicílico.....	2,0g
Ácido 2-hidroxibenzoico	
Agentes de formulación c.s.p.	100,0g

Indicaciones de uso:

Como antimiasmico:

Para el tratamiento de las heridas agusanadas ó “bicheras” de los bovinos, ovinos, porcinos y equinos.

Como preventivo:

Aplicar sobre heridas recientes, provocadas por la castración, descorne, señalada, esquila, etc.

Como curativo:

Para el tratamiento de las heridas agusanadas ó “bicheras” se deben cubrir íntegramente las cavidades y superficies de las mismas con el fin de eliminar las larvas repitiendo el tratamiento a los 3 ó 4 días y luego a intervalos semanales hasta la curación de la herida.

Precauciones de uso:

No comer, beber, ni fumar durante la aplicación. Usar guantes de goma. Luego de la aplicación, lavar las partes del cuerpo que estuvieron en contacto con el producto con abundante agua y jabón. Entre la última aplicación y el sacrificio del animal para consumo alimentario humano deben transcurrir no menos de 3 días. Entre la última aplicación y el ordeño del animal para consumo alimentario humano deben transcurrir no menos de 3 días.

Almacenamiento y eliminación:

Almacenar en su envase original cerrado, fuera del alcance de los niños, mascotas y personas inexpertas. No almacenar ni transportar con alimentos. Preservar de las heladas (0°C) y del calor excesivo (35°C). El descarte del producto o de su envase vacío debe realizarse de acuerdo a las normativas nacionales, estatales y/o municipales. Inutilizar los envases vacíos perforándolos. Requerir información local para su destrucción.

PRIMEROS AUXILIOS

Salpicaduras en los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos. Llamar al médico.

Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. No aplicar pomadas, ni cremas, ni aceites. Llamar al médico. Síntomas: irritación de los ojos y la piel, puede provocar picazón que luego desaparece.

En caso de ingestión: beber abundante agua:2 litros con carbón activado y 1 litro con sulfato de sodio al 3%. No dar nada de beber a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Llamar al médico.

NOTA PARA EL MEDICO

Ante la ingestión accidental del producto, llamar inmediatamente al médico y no suministrar al afectado sustancias grasas, ni leche. Lleve el envase al médico.

FICHA TÉCNICA

Contiene: Cipermetrina. Grupo químico: piretroide. Antídoto: no tiene; aplicar tratamiento sintomático. Contiene Ácido salicílico (antiinflamatorio no esteroide (AINE)).

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES

Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. Centro Toxicológico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez-CABA Tel 4962-6666. Centro de Toxicología –Rosario–Santa Fe Tel (0341) 446 0077. Hospital de Niños –Córdoba Tel (0351) 422 9961 y 423 3303 int 136.

**Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.
Mantener fuera del alcance de los niños.**

senasa

Certificado N° 81.046

Est. Elaborador N° 8.252.

Fabricante: ATANOR S.C.A.

Albarellos 4914 (B1605AFR), Munro, Pcia. de Buenos Aires,
Argentina. Tel.: +54 11 4721 3400 –Fax: +54 11 4721 3480

www.atanor.com.ar.

Director Técnico: Lic. Jorge Osvaldo Oliver. Matrícula CPQPBA N° 5018.

Comercializado y distribuido:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.