

FICHA TÉCNICA**COOPERMEC®**

Antiparasitario interno y externo para bovinos.

PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE:

Nematodos gastrointestinales, gusanos pulmonares, ácaros de la sarna, piojos y ura.

FÓRMULA:

Cada 100 ml contiene:

Ivermectina 1 g.
Agentes de formulación c.s.p. 100 ml.**DOSIS:**

Para el ganado vacuno: 1 ml cada 50 k de peso vivo equivalentes a 200 µg de Ivermectina por k.p.v.

Esquema de dosificación a utilizar:

Límite de peso (kg)	Volumen de dosis (ml)	Límite de peso (kg)	Volumen de dosis (ml)
Hasta 50	1.0	301 a 350	7.0
51 a 100	2.0	351 a 400	8.0
101 a 150	3.0	401 a 450	9.0
151 a 200	4.0	451 a 500	10.0
201 a 250	5.0	501 a 550	11.0
251 a 300	6.0	551 a 600	12.0

APLICACIÓN:

Debe administrarse por vía subcutánea únicamente en zonas de piel laxa como la ubicada delante o tras la paleta. No usar la administración intramuscular. Por tratarse de una medicación inyectable, deberán adoptarse correctas medidas de asepsia. Se sugiere el uso de una aguja de calibre 15 de 12 a 20 mm.

INDICACIONES:Parásitos gastrointestinales: *Ostertagia ostertagi* (adultos L3 y L4 incluyendo larvas inhibidas), *Haemonchus placei* (adultos, L3 y L4), *Trichostrongylus axei* (adultos y L4), *Trichostrongylus colubriformis* (adultos y L4), *Cooperia oncophora* (adultos y L4), *Cooperia pectinata* (adultos y L4), *Cooperia spp* (adultos y L4), *Oesophagostomum radiatum* (Adultos y L4), *Nematodirus helvetianus* (adultos), *Nematodirus spathiger* (adultos), *Strongyloides papillosus* (adultos), *Bunostomum phlebotomun*: adultos y L4, *Toxocara vitulorum* (adultos). *Trichuris spp*. Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* (adultos, L4 y estados inhibidos). Ácaros de la sarna: *Psoroptes ovis* (*Psoroptes communis* var. *Bovis*), Ura: *Dermatobia hominis*, *Hypoderma spp*. Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*. Ayuda al control del piojo masticador: *Damalinia bovis*.**PRECAUCIONES:**

Se debe aplicar únicamente en animales en buen estado general.

FICHA TÉCNICA

RESTRICCIONES DE USO:

No se deben sacrificar animales cuya carne se destine a la alimentación humana hasta 35 días post-tratamiento. No aplicar en vacas en ordeño, ni 28 días antes del parto.

ADVERTENCIA:

Subsiguientemente a la administración subcutánea se ha observado malestar pasajero en algunos animales. Se ha notado con baja frecuencia una tumefacción de los tejidos blandos en el sitio de inyección. Estas reacciones han desaparecido sin necesidad de tratamiento.

En animales sensibles pueden producirse shocks alérgicos, en tal caso aplicar adrenérgicos y/o antihistamínicos. La aplicación de nuestro producto debe ser realizado bajo asesoramiento y control médico veterinario, INTERVET S.A. no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en nuestras instrucciones, por no haberse observado las precauciones establecidas o por no haberse realizado el tratamiento bajo supervisión profesional.

Almacenamiento:

Mantener entre 5° y 30°C. El frasco debe guardarse en el envase de cartón para protegerlo de la luz.

Presentación:

Frasco ampolla de 500 ml.

USO VETERINARIO. VENTA BAJO RECETA.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

Elaborado por: Uruguay.



Extensión de certificado N° 04-051

Comercializado y distribuido:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.