

FICHA TÉCNICA

Coopermicina® 20% LA Antibiótico de amplio espectro

FÓRMULA:

Cada 100 ml contiene:

Oxitetraciclina clorhidrato 20,0 g.
Excipientes c.s.p. 100,0 ml.

INDICACIONES:

Oxitetraciclina de larga duración para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes Gram+, Gram- (aeróbicos y anaeróbicos), Micoplasmas, Chlamidias, Rickettsias, algunos protozoos y Hongos patógenos.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN: Parenteral, por inyección intramuscular profunda con los cuidados de asepsia que corresponden a la aplicación de cualquier medicación inyectable.

DOSIS RECOMENDADA:

Bovinos, ovinos y porcinos: 1 ml cada 10 kg de peso vivo equivalente a 20 mg de oxitetraciclina/kpv.
Aves: 0.15 - 0.30 ml/kg (+/- 50 mg de oxitetraciclina/kpv).

RESTRICCIONES DE USO:

Entre la finalización del tratamiento y el sacrificio de los animales para consumo humano, deben transcurrir 28 días.

- No administrar en vacas lecheras en producción para consumo humano.
- No administrar a ponedoras en producción de huevos para consumo humano.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

El uso de este producto sin un diagnóstico correcto puede generar resistencia antimicrobiana. Se deberá respetar la dosis, intervalos y duración del tratamiento.

CONSERVACIÓN:

Mantener en lugar seco entre 15 y 25°C.

Presentación:

Frasco x 250 ml.

Elaborado en: Uruguay

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.

 **senasa**

Extensión de certificado N° 06-146

FICHA TÉCNICA

Comercializado y distribuido:
Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,
Méd. Vet. MPBA 4505.