

## FICHA TÉCNICA

### Curabicheras Coopers® Platinum Antiparasitario externo

#### Composición:

DDVP (vapo) (1) 1,60 g; Cipermetrina(2) 0,37 g; Sulfadiazina 0,11 g; Butóxido de piperonilo 0,021 g; Aluminio en polvo 4,725 g; Excipiente c.s.p. 100 ml.

(1) 2,2-diclorovinil dimetil fosfato.

(2) 2,2-dimetil-3-(2,2 diclorovinil) ciclopropil carboxilato de alfaciano 3-fenoxibencilo.

#### Indicaciones de uso:

Tratamiento y prevención de las miasis (bicheras) ocasionadas en todo tipo de heridas. Ectoparasiticida, repelente, antimiásico, hemostático, de gran adherencia que favorece la antisepsia y la cicatrización.

Por las características de la formulación, posee gran poder de volteo sobre las moscas y sus larvas y una actividad residual prolongada, evitando la contaminación.

#### FORMA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Uso tópico. Agitar bien el envase antes de usar.

Aplicar a 15-20 cm de distancia sobre la herida y sus alrededores una vez por día. Repetir la aplicación cuando se considere necesario, hasta total reparación de la herida.

#### PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES DE USO:

No usar en felinos.

Producto tóxico para peces, pájaros y abejas. No administrar por vía oral. Manipular con precaución. Evitar el contacto directo con la piel y mucosas.

No inhalar, comer, beber ni fumar durante su aplicación. Luego de efectuar la misma, lavarse las manos con agua y jabón.

Evitar excesivas pulverizaciones en ambientes cerrados. No almacenar junto con alimentos.

No reutilizar, perforar ni arrojar al fuego los envases vacíos. Enterrarlos lejos de lagos y corrientes de agua.

En caso de intoxicación no provocar el vómito. Llamar al médico. Tratamiento: Sulfato de Atropina al 1%.

#### RESTRICCIONES DE USO:

Entre el último día de tratamiento y el sacrificio de los animales para consumo humano, deben transcurrir 6 días. Entre el último ordeño y el destino de la leche para consumo humano deben transcurrir 6 días.

#### Almacenamiento:

Conservar en lugar seco y fresco y al abrigo de la luz solar. Mantener entre 5°C y 30°C.

**No exponer a temperaturas superiores a 40°C.**

#### Presentación:

Envase Aerosol x 440 mls.

**Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.**

## FICHA TÉCNICA

---

Uso externo  
Tóxico clase III, ligeramente peligroso.



Extensión de Certificado N° 06-263

Comercializado y distribuido:  
Intervet Argentina S.A.  
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.  
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,  
Méd. Vet. MPBA 4505.