

FICHA TÉCNICA

Fenomax® Plus 3,5% LA

Endectocida inyectable para el tratamiento y control de los parásitos internos y externos de los bovinos y ovinos.

Composición:

Cada 100 mL contiene:

Ivermectina	2.25 g
Abamectina	1.25 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

Indicaciones de uso:

Fenomax Plus 3.5% LA es un endectocida de amplio espectro para el control de nematodos gastrointestinales en bovinos y ovinos; garrapata de los bovinos y sarna ovina.

1 – Parásitos internos:

Nematodos gastrointestinales	formas inmaduras	adultos
<i>Haemonchus contortus</i>	•	•
<i>Cooperia punctata</i>	•	•
<i>Cooperia oncophora</i>	•	•
<i>Haemonchus placei</i>	•	•
<i>Nematodirus helvetianus</i>	•	
<i>Ostertagia ostertagi</i>	•	•
<i>Trichostrongylus axei</i>	•	•
<i>Trichostrongylus colubriformis</i>	•	•
<i>Trichuris ovis</i>	•	

2 – Parásitos externos:

Boophilus microplus y *Psoroptes ovis*.

Aprobado como garrapaticida bovino en la prueba biológica realizada en el campo experimental cambá punta (provincia de corrientes). Obteniendo un porcentaje de eficacia de 98.55% y un poder residual absoluto de 27 días.

Aprobado por SENASA como garrapaticida bovino para ser utilizado en las zonas de control (infestadas), erradicación (Res. SENASA N° 896/1999) y en foco de zona indemne.

Especies de destino:

Bovinos y ovinos.

FICHA TÉCNICA**Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:**

Administrar por vía subcutánea una dosis única para bovinos y ovinos de 1 ml /50 kg pv (450 µg Ivermectina/kg pv y 250 µg de Abamectina/kg pv).

Tabla de Dosificación	
Peso corporal	Volumen
50 kg	1 ml
51-100 kg	2 ml
101-150 kg	3 ml
151-200 kg	4 ml
201-250 kg	5 ml
251-300 kg	6 ml
301-350 kg	7 ml
351-400 kg	8 ml
401-450 kg	9 ml
451-500 kg	10 ml
501-550 kg	11 ml
551-600 kg	12 ml

Para animales que pesen más de 600 kg mantener la dosificación de 1 ml /50 kgpv.

Contraindicaciones:

No se describen.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

No administrar en terneros antes de las 16 semanas de edad o con un peso inferior a los 120 kg ni en ovinos de menos de 10 kg, o en animales debilitados.

Aplicar solo por vía subcutánea.

Utilizar según las dosis indicadas.

No destinar la leche de animales tratados para consumo humano.

No administrar por vía endovenosa o intramuscular.

No administrar en animales muy debilitados.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No se describen.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

No se describen.

Período de retiro:

Bovinos: 150 días.

Ovinos: 70 días.

No administrar en vacas lecheras en producción.

FICHA TÉCNICA

Almacenamiento:

Conservar en su envase original al abrigo de la luz entre 15° y 25°C.

Presentación:

Envase de 500 mL.

Elaborado en: Brasil

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.



Certificado N° 16-075

Comercializado y distribuido:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.