
Porcilis ColiClos®
Suspensión inyectable para cerdos.

Composición:

Cada dosis de 2 ml contiene:

Componentes de *E. coli*:

- Adhesina fimbrial F4ab $\geq 9.3 \log_2$ título Ab¹
- Adhesina fimbrial F4ac $\geq 6.5 \log_2$ título Ab¹
- Adhesina fimbrial F5 $\geq 7.5 \log_2$ título Ab¹
- Adhesina fimbrial F6 $\geq 7.4 \log_2$ título Ab¹
- Toxoide LT $\geq 10.5 \log_2$ título Ab¹

Componentes de *Clostridium perfringens*:

- Antígeno tipo C ≥ 20 UI

¹Título medio de anticuerpos (Ab) obtenido tras la vacunación de ratones.

Adyuvante: Acetato de dl- α -tocoferilo 150 mg

Especie de destino:

Porcinos (cerdas adultas y nulíparas).

Indicaciones:

Para la inmunización pasiva por calostro de la progenie mediante la inmunización activa de cerdas nulíparas y adultas y para reducir la mortalidad y signos clínicos durante los primeros días de vida, causados por cepas de *E. coli*, que expresan las adhesinas F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) o F6 (987P) y/o que producen el toxoide LT y provocadas por *C. perfringens* tipo C. En condiciones de campo se observa un efecto positivo contra infecciones provocadas por *C. perfringens* tipo A.

Dosis y vía de administración:

Inyección intramuscular de 1 dosis (2 ml) de vacuna por cerda adulta/nulípara, en el cuello detrás de la oreja.

Programa de vacunación:

Vacunación básica: En cerdas adultas/nulíparas que no han sido vacunadas con el producto, se debe administrar una primera dosis de 6 a 8 semanas antes de la fecha prevista para el parto, seguida de una inyección de refuerzo 4 semanas más tarde.

Revacunación: Se administra una sola revacunación de 2 a 4 semanas antes de la fecha prevista para el parto.

Recomendaciones para la correcta administración:

Antes de utilizar, permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente.
Agite enérgicamente antes de usar y a intervalos regulares durante su uso.
Evite la introducción de contaminantes.

Contraindicaciones:

Ninguna

Reacciones adversas:

Tras la vacunación, puede observarse un aumento pasajero de la temperatura corporal y una inflamación transitoria en la zona inyectada.

FICHA TÉCNICA

Período de retiro:

Cero días

Advertencias:

Aplíquese sólo en animales sanos.

Utilice agujas y jeringas estériles para su aplicación.

Deseche el frasco mediante incineración.

En caso de auto inyección accidental, consulte al Médico inmediatamente y muéstrelle el texto del envase o el prospecto.

Puede utilizarse durante la gestación.

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con cualquier otro medicamento de uso veterinario. Por lo tanto, la decisión de usarla antes o después de cualquier otro medicamento veterinario se debe tomar dependiendo de cada caso.

No mezclar con ningún otro medicamento veterinario.

Periodo de validez una vez abierto el envase: 10 horas.

Condiciones de almacenamiento:

Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C. No congelar.

Elaborado en: Holanda

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.



Certificado N° 16-016

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.