

FICHA TÉCNICA

Porcilis® PCV M Hyo Inmunógeno viral y bacteriano inactivado.

Composición:

Circovirus porcino tipo 2 subunidad antigénica ORF 2 \geq 1414 AU

Mycoplasma hyopneumoniae inactivado \geq 2,69 RPU

Adyuvante: Aceite mineral ligero, Aluminio (como hidróxido), Monooleato de sorbitan, Polisorbato 80, Alcohol etílico, Glicerol.

Diluyente: Solución Fisiológica Salina csp 1 ml.

Indicaciones de uso

Para la inmunización activa de cerdos con el fin de reducir la viremia, la carga viral en órganos y tejidos linfáticos y la propagación del virus causante de una infección con PCV2 como así también la severidad de las lesiones pulmonares causadas por una infección con *Mycoplasma hyopneumoniae*. También ayuda en la reducción de la pérdida de peso diario y la mortalidad asociadas a infecciones con PCV2 y/o *Mycoplasma hyopneumoniae*.

PCV2:

Adquisición de la inmunidad: 2 semanas.

Duración de la inmunidad: 22 semanas.

M. hyopneumoniae:

Adquisición de la inmunidad: 4 semanas.

Duración de la inmunidad: 21 semanas.

Especies de destino:

Porcinos.

Contraindicaciones:

Ninguna.

Reacciones adversas (frecuencia y gravedad):

El día de la vacunación, se puede observar un aumento transitorio de temperatura de un 1°C aproximadamente. Esta situación se normaliza al día siguiente. En algunos animales se puede observar reacciones sistémicas leves hasta el día siguiente a la vacunación. Se pueden detectar reacciones locales transitorias en los sitios de inyección.

Especies de destino:

Cerdos.

Posología y vía de administración:

Aplicar una dosis de 2 ml por vía intramuscular en cerdos a partir de las 3 semanas de edad.

Antes de utilizar la vacuna, permitir que alcance la temperatura ambiente y agitar bien antes de usar. Evitar el ingreso de contaminación.

Período de retiro:

Cero.

FICHA TÉCNICA

Precauciones especiales de almacenamiento:

Refrigerar (+2°C - +8°C). No congelar. Proteja el producto de la luz solar. Una vez abierto el envase, utilice el producto dentro de las 8 horas siguientes.

Precauciones especiales para su uso en animales

Vacunar solo animales sanos.

Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el producto a animales

Al usuario:

Este producto contiene aceite mineral. La aplicación por accidente/auto-aplicación puede provocar dolor severo e hinchazón, en particular si se lo aplica en articulaciones o en los dedos. En casos aislados puede resultar en la pérdida del dedo si no se recibe atención médica de forma inmediata. Si accidentalmente se aplica este producto, incluso si la cantidad es escasa, consulte a su médico a la brevedad y muéstrele este prospecto. Si el dolor persiste por más de 12 horas luego de la consulta a su médico, vuelva a consultar.

Al médico:

Este producto contiene aceite mineral. Incluso una cantidad escasa puede provocar hinchazón grave que resulte, por ej., en necrosis isquémica o incluso la pérdida de un dedo. Se requiere la atención quirúrgica urgente de un experto y se puede precisar una incisión anticipada e irrigación de la zona afectada, especialmente cuando se involucra la yema del dedo o un tendón.

No se encuentra disponible información sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se la aplica en simultáneo con otro medicamento veterinario. Se debe decidir sobre la aplicación de esta vacuna antes o después de la administración de otro medicamento veterinario en cada caso en particular.

No mezclar con otros medicamentos veterinarios.

Elaborado en: Holanda

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.



Certificado N° 17-048

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.