

## FICHA TÉCNICA

### Regumate® Equinos Regulador del ciclo estral en yeguas

#### COMPOSICIÓN

Altrenogest.....	2,2 mg
Excipientes c.s.p.....	1 ml

#### INDICACIONES

En yeguas con actividad folicular significativa durante el período de transición entre el anestro estacional y la estación reproductiva (foliculos de al menos 20-25 mm presentes al comienzo del tratamiento):

- Supresión/prevención del estro (generalmente luego de 1 a 3 días de tratamiento) durante los períodos de estro prolongado que se pueden observar en el período de transición.
- Control del momento de inicio del estro (aproximadamente el 90 % de las yeguas muestran signos de estro dentro de los 5 días posteriores a la finalización del tratamiento) y sincronización de la ovulación (60% de las yeguas ovulan entre los días 11 y 14 luego de finalizado el tratamiento).
- Para el mantenimiento de la preñez en yeguas con riesgo de pérdida embrionaria temprana.

#### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Administrar por vía oral 0,004 mg de altrenogest/kg/día durante 10 días consecutivos (equivalente a 1 ml de Regumate/50 kg por día durante 10 días).

#### RECOMENDACIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Retirar con cuidado el volumen de producto correspondiente al peso del animal a tratar (1 ml de Regumate cada 50 kg) y administrarlo por vía oral.

Utilizando guantes, retirar la tapa original del producto y en su lugar enroscar el adaptador provisto. Manteniendo la botella en posición vertical, enroscar la jeringa en el orificio del adaptador, invertir la botella y retirar cuidadosamente la solución utilizando la jeringa. Volver la botella a la posición vertical antes de retirar la jeringa. Colocar la tapa del adaptador en su lugar.

El producto debe ser agregado al alimento del animal en una sola de las raciones diarias o, en su lugar, administrado directamente en la boca utilizando una jeringa.

#### CONTRAINDICACIONES:

No administrar en yeguas en las que se haya diagnosticado endometritis.

No usar en machos.

#### EFFECTOS ADVERSOS

Las reacciones adversas, tales como infección uterina, son extremadamente raras.

#### ADVERTENCIAS

##### Precauciones especiales de uso:

El alimento medicado debe ser suministrado inmediatamente luego de su preparación y no debe ser almacenado. El alimento no consumido no debe ser suministrado a ningún otro animal.

##### Precauciones especiales para la persona que administra el producto a los animales:

- Las mujeres embarazadas o con sospecha de embarazo deben evitar el contacto con el producto. Las mujeres en edad reproductiva deben manipular el producto con extremo cuidado. El producto no debe ser

## FICHA TÉCNICA

manipulado por personas con tumores progesterona-dependientes o con sospecha de los mismos o en aquellas que poseen afecciones tromboembólicas.

- Se debe evitar el contacto directo con la piel. Durante la manipulación del producto se debe utilizar ropa protectora (guantes y overalls). Los guantes porosos pueden permitir que el producto entre en contacto con la piel. La absorción percutánea puede ser mayor si el área está cubierta con material oclusivo tal como guantes de látex o goma. El salpicado accidental de la piel debe ser lavado inmediatamente con agua y jabón. Lavar las manos luego del tratamiento y antes de las comidas.
- En caso de contacto accidental con los ojos, lavar con abundante agua. Buscar asistencia médica.
- Efectos de la sobre-exposición: la absorción repetida puede llevar a una alteración del ciclo menstrual, calambres abdominales o uterinos, mayor o menor sangrado uterino y prolongación del embarazo y dolor de cabeza.

Con el fin de asegurar un uso efectivo del producto, el estado de transición con cierta actividad folicular debe ser confirmado.

### USO DURANTE LA PREÑEZ Y LACTACIÓN

Preñez:

No corresponde. Sin embargo, la administración accidental durante la preñez no es perjudicial ya que los estudios en yeguas no han mostrado ninguna evidencia de efectos teratogénicos, fetotóxicos ni maternotóxicos.

Lactación:

Es improbable que el uso durante la lactación tenga algún efecto perjudicial.

### INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS MEDICINALES

La griseofulvina puede alterar los efectos de altrenogest si se administra concomitantemente con este producto.

### PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DE SOBRES O MATERIAL DE DESECHO

Eliminar cualquier sobrante de alimento tratado o producto sin usar por incineración.

### PERÍODO DE RESTRICCIÓN

Entre el tratamiento y el sacrificio de los animales para el consumo humano deben transcurrir 15 días.

No utilizar en yeguas lactantes cuya leche se destine al consumo humano.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar entre 5 y 25°C. Una vez abierto utilizar dentro de los 4 meses.

### Presentación:

Frasco de 1l.

Elaborado en: Francia.

**Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta archivada.**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.**

## FICHA TÉCNICA

---



Certificado N° 83.198

Comercializado y distribuido:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.