

Warrior®
Caravanas insecticidas para ganado bovino
(incluyendo vacas lecheras en producción)

Composición:

DIAZINON 0,0-dietil-0-(2-isopropil-6-metil-4-pirimidilo) fosforotionato.....	30,0%
CLORPIRIFOS 0,0-dietil-0-(3,5,6-tricloro-2-pirildilo) fosforotionato.....	10,0%
INGREDIENTES INERTES.....	<u>60,0%</u>
TOTAL.....	100,0%

PESO NETO DE CADA CARAVANA: 15 gramos

Indicaciones:

Controla la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) resistente a piretroides y los piojos (*Bovicola bovis* y *Linognathus vituli*). Ayuda en el control de la mosca de la cara (*Musca autumnalis*).

Instrucciones de uso:

Mosca de los cuernos: Aplicar la caravana cuando la mosca comienza la actividad en primavera. No tratar terneros menores a 3 meses de edad. Aplicar **una caravana** por animal para controlar la mosca de los cuernos por **3-4 meses**. Dos caravanas por animal (una en cada oreja) controlan la mosca de los cuernos por hasta 5 meses y ayuda a controlar la mosca de la cara. Para el control óptimo aplicar caravanas en todo el rodeo.


Piojos: Aplicar **una caravana** por animal durante el otoño o principios del invierno para su control. Retirar luego de finalizado el periodo de actividad.

Colocación:

PASO 1: Colocar firmemente el soporte macho en la aguja del aplicador, empujando hacia abajo y haciendo tope.

PASO 2: Colocar la caravana hembra firmemente debajo de la palanca del aplicador. El collar de la caravana debe quedar hacia afuera de la aguja.

PASO 3: Colocar el aplicador sobre la oreja y presionar para la colocación. La posición ideal del macho es entre el segundo y tercer cartilago radial (tercio medio de la oreja).



Almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco en su envase original, entre 5° y 25°C, al resguardo de la luz del sol. Las bolsas abiertas que contengan caravanas deben ser quitadas del lugar de almacenamiento.

FICHA TÉCNICA

Restricciones de uso:

No requiere tiempo de retiro. Pero sí asegurarse de que las caravanas sean retiradas antes de enviar el animal a la faena.

Precauciones en humanos:

Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Este producto contiene diazinón y clorpirifos, insecticidas organofosforados que inhiben la colinesterasa. Puede ser mortal si se ingiere. Perjudicial su inhalación o absorción cutánea. Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Evite la inhalación de vapores. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Lávese bien las manos con abundante jabón y agua luego de administrar el producto y antes de comer, beber o fumar. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. No contaminar alimentos.

En caso de ingestión, inhalación o contacto con los ojos, llamar al Centro de Intoxicaciones o recurrir a un médico inmediatamente llevando la caja del producto. Como primeras medidas, mientras se busca a un médico, se recomiendan:

- En caso de contacto con los ojos, mantenerlos abiertos y lavar con abundante agua durante 15-20 minutos.
- En caso de tener lentes de contacto, quitárselos luego de 5 minutos, y continuar lavando los ojos.
- En caso de inhalación llevar a la persona a un lugar con aire fresco.

INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO:

El diazinón y clorpirifós son insecticidas organofosforados. En caso de intoxicación usar tratamientos para organofosforados. Si se presentan síntomas de inhibición de la colinesterasa, el antídoto es el sulfato de atropina 1% inyectable. El 2-PAM también puede emplearse como antídoto, pero sólo si se lo combina con sulfato de atropina.

PRECAUCIONES AMBIENTALES:

No contaminar agua o alimentos por la conservación o eliminación del producto. Las caravanas usadas deben ser colocadas en bolsas plásticas o con varias capas de papel de diario y desecharlas en cestos de basura. No reutilizar las bolsas que contenían las caravanas.

Este producto es altamente tóxico para peces, aves y otras especies de la flora y fauna. No arrojar al agua ni contaminar el agua al desechar las caravanas usadas. Use este producto sólo como lo indica la etiqueta.

IMPORTANTE: Y-TEX® y los distribuidores no se hacen responsables del uso del producto ya que su comercialización y manejo están fuera del control de estas compañías. El producto posee garantía limitada solamente al reemplazo de las caravanas, si la caravana falla luego de ser aplicada correctamente, o no permanece en la oreja del animal por un período de cinco (5) meses debido a la rotura de la caravana o a la separación del soporte.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

Otros Centros de consulta en el país:

BUENOS AIRES:

- Ctro. Nac. de Información Toxicológica (CNITV) Universidad del Centro, Tandil, tel: (0266)4286278
- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Bs. As tel: (011) 4962-6666/2247
- Cátedra de Toxicología, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, tel: (011) 4964-8200/8283/8284

FICHA TÉCNICA

•Ctro. Nac. de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Bs.As., tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777

•Sala de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata, tel: (0221) 4515555

CÓRDOBA:

•Hospital de Niños, tel; (0351) 423-0597/4388 y 421-5303

•Hospital Santa Rosa, tel: (0351) 42-0299

•Hospital Infantil, tel: (0351) 470-3952/3492/3565

•Hospital de Urgencias, tel: (0351) 422-7181, 423-0472 y 421-5001

CHACO:

•Hosp. Dr. Julio C. Perrando, tel: (03722) 425050, 425924 y 427233

SANTA FE:

•Centro de consultas Toxicológicas CASAFE, tel: (0341) 448-0077 y 424-2727

•Hospital Piloto, tel: (0342) 4597371

•Hosp. de Niños "Jesús Vilela", Rosario, tel: (0341) 480-2133, 438-3829 y 437-1415

Presentación:

5 bolsas con 20 caravanas cada una. 100 caravanas en total.

Elaborado en: EE.UU.

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.

Mantener fuera del alcance de los niños.



Certificado N° 99.230

Comercializado y distribuido:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.