

**FICHA TÉCNICA****Nafpenzal DC**

Antibiótico antimastítico para el período seco.

Composición:

Cada inyector de 3 g contiene:

Penicilina G procaínica (300.000 U.I.) 300 mg

Dihidroestreptomicina (como sulfato) 100 mg

Nafcilina (como sal sódica) 100 mg

Indicaciones

Terapia de rutina en vacas durante el período seco; tratamiento de infecciones subclínicas y prevención de nuevas infecciones por bacterias sensibles a la penicilina, estreptomicina y nafcilina que puedan ocurrir durante el período de secado. Bacterias sensibles incluyen *Staphylococcus pyogenes*, *Streptococcus agalactiae*, *Str. dysgalactiae*, *Str. uberis*, *Corynebacterium pyogenes* y *Escherichia coli*. El sinergismo entre penicilina y estreptomicina combinadas produce una mayor actividad que el uso de cualquiera de estos productos por separado, y estos en combinación con la nafcilina semisintética, aseguran un amplio espectro de acción contra una gran variedad de bacterias incluyendo estafilococos resistentes a la penicilina.

Dosificación y vía de administración

El contenido de un inyector de 3 g se infunde en cada cuarto mamario cuando la vaca entra en el período de secado al final de cada lactación. Antes de su empleo, se deberá ordeñar la ubre hasta que quede completamente seca. Limpiar el orificio del pezón en forma minuciosa, remover la tapa del inyector e introducir la cánula cuidadosamente por el orificio del pezón. Vaciar lentamente el contenido completo del inyector en el pezón y masajear suavemente para dispersar la suspensión en el interior del cuarto. Luego masajear cada cuarto.

Precauciones:

Período de retiro en leche: intervalo entre el tratamiento y el parto mayor o igual a 42 días: descartar la leche por 3 ordeños tras el parto. Intervalo menor a los 42 días: la leche debe analizarse para determinar los residuos de antibióticos antes de su liberación para consumo humano.

Período de retiro en carne: No destinar los animales al consumo humano antes de las 5 semanas posteriores al tratamiento.

Efectos colaterales: Se han observado alergias ocasionales a la penicilina, pero estos casos son muy raros.

El uso de este producto sin un diagnóstico correcto puede generar resistencia antimicrobiana. Se deberá respetar la dosis, intervalos y duración del tratamiento.

Los envases utilizados deben ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

Almacenamiento:

Conservar entre 15°-25°C.

Presentación:

Caja con 20 inyectores

Elaborado en Holanda



NAFPENZAL DC
Antibiótico Intramamario Secado

FICHA TÉCNICA

**Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.**



Certificado N° 00-300

Comercializado y distribuido:
Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,
Méd. Vet. MPBA 4505.