

FICHA TÉCNICA
Bravecto® Spot on
 Antiparasitario externo de acción sistémica.

Fluralaner es un antiparasitario de acción sistémica perteneciente a la clase isoxazolinas. Fluralaner es un potente inhibidor del sistema nervioso de los artrópodos. Actúa antagonizando los canales de cloro estimulados por ligandos, receptores GABA (ácido gamma aminobutírico) y receptores glutamato.

Composición:

Fluralaner..... 280 mg
 Excipientes c.s.p..... 1 ml

Cada pipeta contiene:

	Contenido de la pipeta (ml)	Fluralaner (mg)
Para gatos pequeños 1.2 – 2.8 kg	0,4	112,5
Para gatos medianos >2.8 – 6.25 kg	0,89	250
Para gatos grandes >6.25 – 12.5 kg	1,79	500

Solución translúcida de incolora a amarilla.

Indicaciones de uso:
• Para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas y garrapatas en gatos

Este medicamento proporciona:

- actividad inmediata y persistente durante 12 semanas para matar pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*),
- actividad inmediata y persistente durante 12 semanas para matar garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*).

Las pulgas y garrapatas deben adherirse al hospedador y comenzar a alimentarse para exponerse a la sustancia activa. Bravecto logra la eficacia esperada a las 12 horas siguientes a la fijación para las pulgas y 48 horas para las garrapatas.

• El producto puede utilizarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por picadura de pulga (DAPP).

• El producto controla eficazmente las poblaciones de pulgas en las áreas a las cuales tienen acceso los gatos tratados.

• Para el tratamiento de infestaciones por el ácaro del oído (*Otodectes cynotis*) en gatos.

Por su efecto acaricida sistémico de duración prolongada, tiene acción sobre *Otodectes cynotis*. Una sola aplicación de Bravecto Spot On alcanzó una eficacia del 100 % a los 28 días luego del tratamiento observándose la disminución de los detritos y cerumen asociados a la infestación con *O. cynotis*.

Especies de destino:

Felinos.

FICHA TÉCNICA**Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:**

Para uso tópico.

Bravecto Spot On debe administrarse de acuerdo con la siguiente tabla (correspondiente a una dosis de 40-94 mg de fluralaner/kg de peso):



Peso del gato	Concentración y número de pipetas a ser administradas		
	Bravecto Spot On 112,5 mg	Bravecto Spot On 250 mg	Bravecto Spot On 500 mg
1,2 – 2,8	1		
>2,8 – 6,25		1	
>6,25 – 12,5			1

Para gatos de más de 12.5 kg de peso utilice una combinación de dos pipetas que se ajuste lo más posible al peso del animal.

Método de administración:

Paso 1: Inmediatamente antes de usar, abra el sobre y saque la pipeta. Ésta debe sostenerse en posición vertical (la punta hacia arriba) por la base o por la parte rígida superior debajo de la tapa.

La tapa debe rotarse completamente en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a éstas. La tapa se mantendrá adherida a la pipeta; no es posible desprenderla. La pipeta estará abierta y lista para usarse cuando sienta que el sello se ha roto.



Paso 2: Para facilitar la aplicación, el gato debe estar de pie o echado con la espalda colocada horizontalmente. Coloque la punta de la pipeta en la base del cráneo del gato.

Paso 3: Presione suavemente la pipeta y aplique todo el contenido de la solución sobre la piel del gato. El producto debe aplicarse en un sólo punto en la base del cráneo en gatos de hasta 6.25 kg de peso y en dos puntos diferentes en gatos de más de 6.25 kg de peso.

Esquema de tratamiento: Para el mejor control de la infestación por garrapatas o pulgas, el producto debe administrarse a intervalos de 12 semanas.

Contraindicaciones:

No utilizar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los excipientes.

Reacciones Adversas:

En los estudios clínicos se observaron casos esporádicos (2.2% de los gatos tratados) de reacciones leves y temporales en la piel, tales como eritema y prurito en la zona de aplicación.

También se observaron otros signos poco después de la administración: apatía/temblores/anorexia (0.9% de los gatos tratados) o vómito/hipersalivación (0.4% de los gatos tratados).



FICHA TÉCNICA

Si usted observa algún efecto grave u otros efectos no mencionados en este prospecto, por favor informe a su médico veterinario.

Advertencias de uso:

El riesgo de transmisión de enfermedades provocadas por parásitos se reduce substancialmente debido al rápido inicio de la acción acaricida e insecticida. Los parásitos deben iniciar la alimentación en el hospedador para estar expuestos a fluralaner; por lo tanto, no debe excluirse el riesgo de transmisión de enfermedades provocadas por parásitos si las condiciones no son favorables.

Precauciones especiales para uso en animales:

Se debe tener cuidado para evitar el contacto del producto con los ojos del animal.

No se utilice directamente sobre lesiones de la piel.

A falta de datos disponibles, este producto médico de uso veterinario no debe utilizarse en gatitos de menos de 9 semanas de edad y/o gatos que pesen menos de 1.2 kg.

El producto no debe administrarse a intervalos menores a 8 semanas, ya que la seguridad de su aplicación a intervalos más cortos no ha sido probada.

Gestación, lactancia o fertilidad:

La seguridad del producto médico de uso veterinario no ha sido establecida durante la gestación y la lactancia. Utilice únicamente después de que el médico veterinario responsable evalúe el riesgo/beneficio.

Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el medicamento de uso veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta el momento de su uso para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

Una pipeta usada debe descartarse de inmediato.

Este producto y la piel humedecida de un animal recientemente tratado puede ser ligeramente irritante para la piel y/o los ojos.

Evite el contacto con la piel y/o los ojos, incluyendo el contacto de manos a ojos.

No comer, beber ni fumar mientras se esté manipulando el producto.

Lávese cuidadosamente con agua y jabón las manos y la piel inmediatamente después de usar el producto.

Si efectivamente ocurre el contacto del producto con la piel, lave inmediatamente el área afectada con agua.

En algunos casos, el lavado con agua no es suficiente para remover el producto pegoteado en los dedos. Si persisten residuos pegajosos en la piel después del lavado con agua, estos pueden ser removidos usando artículos domésticos que contengan solventes orgánicos [ej. alcohol de frotar (etanol, alcohol isopropílico) o quitaesmalte (acetona)] aplicados suavemente con un hisopo.

En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua.

En caso de ingestión accidental, consulte a un médico y muéstrele el prospecto del empaque o la etiqueta del producto.

No toque ni permita que los niños toquen el lugar de aplicación hasta que esté seco.

El producto es altamente inflamable. Manténgase alejado del calor, chispas, flamas abiertas u otras fuentes de combustión.

FICHA TÉCNICA**Interacciones con otros productos farmacéuticos:**

Ninguna conocida. Fluralaner se encuentra altamente unido a proteínas plasmáticas y podría competir con otros medicamentos de alta afinidad a proteínas tales como los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y warfarina derivada de cumarina. La incubación de Fluralaner en presencia de carprofeno o warfarina en plasma de gato a concentraciones plasmáticas máximas esperadas no reduce la unión a proteínas de fluralaner, carprofeno o warfarina. Durante las pruebas de laboratorio y las pruebas clínicas en campo no se observaron interacciones entre Bravecto Spot On solución tópica para gatos y los medicamentos de uso veterinario generalmente utilizados.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia, antidotos):

Se demostró la seguridad del producto en gatitos de 11-13 semanas de edad y con un peso de entre 1.2 y 1.5 kg tratados en tres ocasiones a intervalos más cortos que los recomendados (intervalos de 8 semanas) con sobredosis hasta 5 veces mayores que la dosis máxima indicada.

La absorción del producto a la dosis máxima recomendada fue bien tolerada por lo gatos, exceptuando algunos signos como salivación autolimitada y tos o vómito inmediatamente después de su administración por vía oral.

Almacenamiento:

Almacenar por debajo de 30°C. Mantener al resguardo de la luz.

Las pipetas deben conservarse dentro del sobre para evitar la pérdida del solvente o la absorción de humedad. Los sobres deben abrirse justo antes de ser utilizados.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA DESCARTAR EL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO

Los medicamentos no deben descartarse vertiéndolos en aguas residuales o en la basura doméstica. Descartar los envases utilizados de acuerdo a la legislación local vigente.

Presentación:

Envase conteniendo 1 pipeta (0,4 ml, 0,89 ml o 1,79 ml)

Elaborado en: EE.UU.

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.



Certificado N° 18-041

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.