

Nobilis® Ae + Pox

Vacuna a virus vivo para la prevención de la Encefalomiélitis y Viruela aviar.

DESCRIPCIÓN:

Vacuna Nobilis® Ae + Pox es una vacuna liofilizada. Cada dosis contiene al menos 2,5 log₁₀ DIE₅₀ del virus de la encefalomiélitis aviar, cepa 1143 (Calnek) y al menos 2,8 log₁₀ DIE₅₀ del virus de la viruela aviar, cepa Gibbs multiplicada en huevos SPF. El pellet de vacuna contiene estabilizadores y sulfato de gentamicina. Se suministra en dos unidades separadas. Una contiene los viales de vacuna y la otra con el vial de diluyente estéril (UNISOLVE).

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de pollitas ponedoras de reposición, y de gallinas y pavas reproductoras de reposición contra la encefalomiélitis aviar y la diferoviruela aviar. Las aves vacunadas quedan protegidas contra la caída de la postura debida a estas enfermedades durante el periodo de postura, y la progenie de las aves vacunadas queda protegida contra encefalomiélitis aviar por las primeras semanas de vida gracias a la inmunización transmitida por vía materna.

ADMINISTRACIÓN:

Aplique la vacuna por punción en el pliegue del ala utilizando el aplicador suministrado.

PREPARACIÓN DE LA VACUNA

Un vial de vacuna debe ser reconstituido con el contenido de un vial de diluyente inmediatamente antes del uso. Insertar el aplicador en la vacuna y luego aplicarlo por punción en el pliegue del ala desde abajo. Se deben evitar las zonas del ala con plumas.

Alrededor de 7-10 días después de la vacunación, se deben examinar algunas aves para verificar la "asimilación" a la vacunación. Esta "asimilación" es satisfactoria cuando en el lugar de la inoculación se observa una inflamación de la piel y la formación de una cicatriz. Las cicatrices suelen caer a las 2-3 semanas de la vacunación.

La inmunización se establece por completo en las tres semanas posteriores a la vacunación.

PROGRAMA VACUNAL

Las gallinas deben ser vacunadas entre 8 y 16 semanas de edad.

Los pavos deben ser vacunados entre 18 y 26 semanas de edad.

PERÍODO DE SUPRESION:

- VACUNAR SOLO ANIMALES SANOS. Aunque la enfermedad puede no ser evidente, la coccidiosis, infección con *Mycoplasma*, enfermedad de Marek y otras condiciones de enfermedad pueden generar complicaciones o reducir el desarrollo de la inmunidad.
- Todas las gallinas sensibles situadas en el mismo lugar deben vacunarse al mismo tiempo.
- No usar menos de una dosis por ave.
- No vacunar dentro de las 4 semanas anteriores al inicio de la postura ni durante el periodo de puesta.
- No vacunar gallinas de menos de 8 semanas ni pavos de menos de 18 semanas.
- Quemar los envases y todo el contenido no usado.



FICHA TÉCNICA

CONDICIONES DE CONSERVACION

La vacuna liofilizada debe conservarse entre 2° y 8° C, en la oscuridad.

Tras la reconstitución, la vacuna debe protegerse del calor y utilizarse en un plazo de unas horas.

PRESENTACION

Frasco por 1.000 dosis.

USO VETERINARIO. VENTA BAJO RECETA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

Elaborado en Holanda.



Certificado N° 92454

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.