

Nobilis® Cor4+IB+ND+EDS

Vacuna inactivada para la prevención de la Coriza infecciosa aviar, la enfermedad de Newcastle, la Bronquitis infecciosa y el Síndrome de Caída de Postura de las aves.

COMPOSICIÓN:

Nobilis® Cor4+IB+ND+EDS es una vacuna inactivada que contiene:

Haemophilus paragallinarum cepa 083 (serotipo A) cepa Spross (serotipo B) cepa H-18 (serotipo C) cepa 48 (serotipo variante tipo B) al menos 1 DP₇₀ al menos 1 DP₇₀ al menos 1 DP₇₀ al menos 1 DP₇₀
 Virus de la bronquitis infecciosa cepa M41: $\geq 2,0 \log_2$ UIH de incremento en pri-movacunación
 Virus del síndrome de caída de la postura cepa BC14: $\geq 3,2 \log_2$ UIH
 Virus de la enfermedad de Newcastle: $\geq 4,0 \log_2$ UIH cada 1/50 de dosis ó ≥ 50 unidades DP₅₀
 Excipientes: parafina líquida, polisorbato 80, sorbitan mono-oleato, agua purificada.

INDICACIONES:

Inmunización activa de aves para reducir la infección y los signos clínicos de coriza infecciosa causada por *Haemophilus paragallinarum*, y para la protección contra el serotipo Massachusetts del virus de la bronquitis infecciosa, la enfermedad de Newcastle y el síndrome de caída de la postura. La protección dura por al menos un ciclo de postura.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Administrar una dosis de 0,5 ml por vía subcutánea en la parte posterior de la base del cuello a partir de las 14 semanas de edad, pero no dentro de las 4 semanas previas al comienzo de la postura. Para una protección óptima contra la Coriza infecciosa, las aves deben ser vacunadas con Nobilis® Corvac 4 al menos 6 semanas antes de la vacunación con Nobilis® Cor4+IB+ND+EDS. Para un efecto de refuerzo óptimo contra la bronquitis infecciosa y la enfermedad de Newcastle, las aves deben ser vacunadas previamente con vacunas vivas al menos 4 semanas antes de la administración de Nobilis® Cor4+IB+ND+EDS. No se requiere una vacunación previa contra el síndrome de caída de la postura.

REACCIONES VACUNALES

Las aves pueden estar menos activas el día posterior a la vacunación, pero las mismas vuelven a la normalidad al día siguiente.

Puede observarse una leve hinchazón transitoria en el sitio de inyección en la mayoría de los animales dentro de las 4 semanas posteriores a la vacunación, la que posteriormente desaparece en forma gradual.

PERÍODO DE RESTRICCIÓN:

Entre la vacunación y el consumo de los animales no es necesario ningún período de espera.

PRECAUCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

- Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de la administración.
- Agitar bien antes de usar y regularmente durante su uso.



FICHA TÉCNICA

- Utilizar equipo de vacunación estéril.
- Evitar la introducción de contaminantes.
- Vacunar solamente animales sanos en la parte posterior de la base del cuello.

CONSERVACIÓN

Conservar entre 2 y 8°C en lugar oscuro. No congelar.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

En ausencia de estudios de compatibilidad, esta vacuna no debe ser mezclada con otros productos veterinarios.

En caso de inyección accidental, se recomienda acudir inmediatamente al médico y mostrarle el prospecto o etiqueta de la vacuna.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Esta vacuna no está recomendada para aves en período de postura.

PRESENTACIÓN

Frascos de 500 ml equivalente a 1.000 dosis.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160

VENTA BAJO RECETA. USO VETERINARIO.

Elaborado en Holanda.



Certificado N° 08-026

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.