

**Nobilis® RT+IB Multi+G+ND**

Vacuna inactivada para la prevención de las enfermedades causadas por Pneumovirus Aviar, Bronquitis Infecciosa, Gumboro y Newcastle de las aves.

**COMPOSICIÓN:**

Nobilis® RT+IBmulti+G+ND contiene una cepa inmunogénica del virus de la Rinotraqueitis de las aves (ARTV), dos cepas inmunogénicas del virus de la Bronquitis Infecciosa (IBV), una cepa inmunogénica del virus de la Enfermedad de Gumboro (IBDV) y una cepa inmunogénica del virus de la Enfermedad de Newcastle (NDV).

El componente de la Bronquitis Infecciosa (IB) contiene una cepa serotipo Massachusetts y una cepa variante perteneciente al serotipo D 274.

Los virus han sido inactivados y suspendidos en la fase acuosa de una emulsión en adyuvante oleoso.

**INDICACIONES:**

La vacuna se recomienda para la vacunación “de refuerzo” de reproductoras para su protección frente a las enfermedades provocadas por el virus de la Rinotraqueitis de las aves, el virus de la bronquitis infecciosa en zonas donde se sepa de la prevalencia de los serotipos I.B. presentes en la vacuna y el virus de la enfermedad de Newcastle. Además, la descendencia de las aves vacunadas estará protegida frente a la Enfermedad de Gumboro por transferencia de la inmunidad maternal durante las primeras semanas de vida.

**PROGRAMA DE VACUNACION RECOMENDADO:**

Debe vacunarse a las aves alrededor de las 14-20 semanas de edad, pero no después de las 4 semanas anteriores al comienzo de la puesta.

Los mejores resultados se obtienen si la vacunación con la vacuna inactivada tiene lugar al menos 4 semanas después de la administración de las vacunas vivas de los componentes antigénicos.

**Dosis y administración:**

La dosis es de 0,5 ml de vacuna por ave administrada por vía intramuscular en el muslo o la pechuga, o por vía subcutánea en la parte posterior del cuello.

**Precauciones:**

- Solamente se vacunarán aves sanas.
- Antes de utilizar la vacuna dejar que alcance la temperatura ambiente (15-25°C).
- Agitar antes de usar.
- Los frascos abiertos deberán utilizarse antes de 3 horas.
- No mezclar con otras vacunas.
- Si el usuario, por accidente, se inyectara la vacuna comunicárselo inmediatamente al médico indicando que la vacuna es una emulsión oleosa.

**Periodo de restricción:**

Ninguno.

**Conservación:**

Almacenar a temperatura entre 2-8°C. No congelar.

**Presentación:**

Fascos de 500 ml equivalente a 1000 dosis.



## FICHA TÉCNICA

---

USO VETERINARIO. VENTA BAJO RECETA.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ctro. Nac. de intoxicaciones: 08003330160

**Elaborado en Holanda.**



Certificado N° 01-126

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.