

**Nobilis® Reo Inac**

Vacuna inactivada para la prevención del Reovirus aviar

**DESCRIPCIÓN:**

Nobilis® Reo Inac contiene dos cepas de reovirus.

Los virus han sido cultivados en células FEP, inactivados con formalina y suspendidos en la fase acuosa de una emulsión en adyuvante oleoso.

**COMPOSICIÓN:**

Componentes activos por dosis:

Cepas 1733 y 2408 de Reovirus Aviar, cada una inductora de  $\geq 7,4 \log_2$  unidades ELISA.

**INDICACIONES:**

Nobilis® Reo Inac se recomienda para la vacunación de refuerzo del plantel reproductor contra Reovirus aviar y para proteger a la descendencia de las aves vacunadas.

**PROGRAMA DE VACUNACIÓN**

Nobilis® Reo Inac se administra entre las 16 y 20 semanas de edad, pero nunca durante las 4 semanas previas al comienzo de la postura.

Para un efecto óptimo de la dosis de refuerzo, las aves deben ser vacunadas previamente con la vacuna viva contra Reovirus aviar.

Los mejores resultados se obtienen cuando la vacuna inactivada se administra al menos 6 semanas después de la vacuna viva, pero en ningún caso debe administrarse durante las 4 semanas siguientes a la primovacunación.

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN**

Se deben administrar 0,5 ml de vacuna por vía intramuscular en el muslo o en la pechuga o por vía subcutánea en la parte posterior del cuello.

**INMUNIDAD**

Cuando la vacunación con vacuna viva e inactivada se realiza correctamente, las aves desarrollan niveles de anticuerpos suficientes para protegerlas contra Reovirus aviar.

En situaciones normales de campo, la descendencia nacida en cualquier momento del ciclo de postura presentará un nivel de anticuerpos maternos suficiente para protegerla contra Reovirus durante las primeras semanas de vida.

**REACCIÓN VACUNAL**

En animales sanos no se observan reacciones clínicas tras la vacunación.

Puede observarse una ligera inflamación en el sitio de inyección o una reacción tisular local durante las semanas siguientes a la vacunación.

**PRECAUCIONES**

- Vacunar solamente animales sanos.
- Dejar que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15-25°C) antes de utilizarla.
- Agitar bien antes de usar.



## FICHA TÉCNICA

---

- Utilizar equipo de vacunación estéril.
- Una vez abierto, su contenido debe utilizarse inmediatamente.
- No mezclar con otras vacunas
- Si la persona que administra la vacuna se inyectara accidentalmente, puede producirse una reacción local. Se recomienda acudir al médico indicándole que la vacuna es una emulsión oleosa.

### CONSERVACIÓN

Conservar en la oscuridad a 2- 8°C. No congelar.

### PRESENTACIÓN

Viales de 500 ml equivalente a 1.000 dosis.

**Elaborado en Holanda.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

USO VETERINARIO. VENTA BAJO RECETA

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160



Certificado N° 85295

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.