

**FICHA TÉCNICA****Nobivac® KC**

Vacuna viva combinada contra el virus de la parainfluenza canina y *Bordetella bronchiseptica*.

Composición:

Cada dosis de 0,4 ml contiene al menos $10^{8.3}$ UFC de *Bordetella bronchiseptica* cepa B-C2 y $10^{3.8}$ DICT₅₀ del virus de la Parainfluenza canina cepa Cornell.

Indicaciones:

Inmunización activa de perros contra la tos de las perreras producida por el virus de la Parainfluenza canina y *Bordetella bronchiseptica*. La inmunidad es completa ya a las 72 horas posteriores a la vacunación.

Especies de destino:

Caninos.

Programa de vacunación:

Administrar una dosis al menos 72 horas antes de la exposición a fuentes potenciales de infección. Los animales deben tener más de dos semanas al momento de la vacunación.

Revacunación:

Luego de la vacunación, la inmunidad perdura por un año. Revacunar anualmente.

Dosis y administración:

Permita que el diluyente alcance la temperatura ambiente. Reconstituya la vacuna liofilizada con el diluyente estéril acompañante. Cargue una jeringa de 1 ml con una dosis (0,4 ml) de vacuna, retire la aguja y conecte la cánula aplicadora. Sujete la cabeza del perro en posición erguida normal, coloque la cánula aplicadora en uno de los orificios nasales y administre con cuidado todo el contenido de la jeringa. La vacuna debe utilizarse dentro de la hora posterior a su reconstitución.

Contraindicaciones y advertencias:

Sólo deberán vacunarse perros en buen estado de salud luego de un examen clínico apropiado. Deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta 72 horas posteriores a la vacunación.

Compatibilidad:

No administrar junto con otros tratamientos intranasales o durante un tratamiento con antibióticos.

Efectos secundarios

No se conocen efectos secundarios luego de la administración de una dosis. En algunos cachorros muy jóvenes y sensibles puede producirse una secreción ocular o nasal leve y transitoria luego de administrar una dosis excesiva.



Nobivac® KC
Administración intranasal

FICHA TÉCNICA

Conservación:

Conservar en lugar oscuro a 2-8°C en la oscuridad. No congelar.

Información adicional:

Nobivac KC puede utilizarse en perras en gestación.

Presentación:

Viales de 1 dosis.

Uso veterinario. Venta bajo receta.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

Elaborado en Holanda.



Certificado N° 00-295

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.