

**FICHA TÉCNICA****Nobivac® Rabies**  
Vacuna inactivada contra la rabia**Composición:**

Cada dosis contiene una potencia de al menos 1 UI de virus de la rabia inactivado cepa Pasteur RIVM. El virus es producido en cultivo de células BHK 21 clon CT e inactivado con beta-propiolactona. Se presenta en una suspensión acuosa de fosfato de aluminio.

**Indicaciones:**

Inmunización activa de perros y gatos contra la rabia.

**Especies de destino:**

Caninos y Felinos.

**Programa de vacunación:**

Primera vacunación a partir de los 3 meses de edad. Revacunar todos los años. Transcurridas 3 semanas después de la vacunación se alcanzan los niveles máximos de anticuerpos.

**Administración:**

Administrar 1 ml por vía intramuscular o subcutánea.  
Agitar bien antes de utilizar.

**Contraindicaciones y advertencias:**

Vacunar solamente animales en buen estado de salud luego de un examen clínico apropiado  
Utilizar equipo estéril para la administración de la vacuna y evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectante o alcohol.  
Ocasionalmente puede producirse un nódulo palpable transitorio en el lugar de la inoculación después de la administración subcutánea.  
Ocasionalmente puede producirse una leve reacción de hipersensibilidad generalizada. En este caso, puede estar indicado administrar adrenalina por vía subcutánea.

**Conservación:**

Conservar en lugar oscuro a 2-8°C. No congelar

**Presentación:**

Viales con 1 dosis.

**Uso veterinario. Venta bajo receta.**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.**

**Elaborado en Holanda.**



Nobivac® Rabies  
Administración parenteral

## FICHA TÉCNICA

---



Certificado N°: 00-294

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.