

**FICHA TÉCNICA****Nobivac® Tricat Trio**

Vacuna viva liofilizada contra la calicivirosis felina, la rinotraqueítis viral felina y la panleucopenia felina.

**Composición:**

Cada dosis contiene al menos 4,6 log<sub>10</sub> UFP de calicivirus felino, al menos 5,2 log<sub>10</sub> UFP de virus de rinotraqueítis viral felina y al menos 4,3 log<sub>10</sub> DICT<sub>50</sub> de virus de la panleucopenia felina por dosis.

El excipiente está compuesto por: gelatina, sucrosa, fosfato disódico dihidrato.

**Indicaciones:**

Inmunización activa de gatos a partir de las 8-9 semanas de edad con el fin de reducir los signos clínicos y la excreción viral causados por una infección con calicivirus felino y virus de la rinotraqueítis felina y para prevenir los signos clínicos, excreción viral y la panleucopenia causados por el virus de la panleucopenia felina. La duración de la inmunidad es de 1 año para los componentes calicivirus y virus de la rinotraqueítis viral felina y de 3 años para el virus de la panleucopenia felina.

**Especies de destino:**

Gatos.

**Dosis y administración:**

Antes de su uso, reconstituir la vacuna con un vial de Nobivac Diluent y permitir que la misma alcance la temperatura ambiente. El contenido de un vial de vacuna reconstituida (1 ml) debe inyectarse subcutáneamente inmediatamente después de su reconstitución.

**Programa de vacunación recomendado:**

Para la vacunación inicial se requieren dos dosis administradas subcutáneamente con un intervalo de 3-4 semanas. La primera dosis se administra a una edad de 8-9 semanas de edad y la segunda a las 12 semanas.

**Reacciones vacunales:**

Se puede producir una leve hinchazón en el sitio de inyección durante algunos días. Puede observarse una elevación transitoria de la temperatura (< 40°C) y ocasionalmente se puede observar un leve malestar general durante dos días luego de la vacunación.

**Advertencias:**

Vacunar solamente animales sanos

Utilizar equipo de vacunación estéril y evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectante o alcohol.

Realizar una adecuada evaluación clínica antes de la vacunación

Luego de la vacunación, evitar el contacto con fuentes potenciales de infección respiratorias hasta 7 días después de la segunda vacunación.

En caso de auto-inyección accidental, consultar al médico y mostrarle el prospecto de la vacuna.

En caso de reacción anafiláctica se recomienda la administración de epinefrina.



Nobivac® Tricat Trio  
Administración parenteral

## FICHA TÉCNICA

---

**Contraindicaciones:**

Debido a que el producto no ha sido evaluado en hembras gestantes o en lactación, no se recomienda el uso durante la gestación o lactación.

**Almacenamiento:**

La vacuna debe conservarse en lugar oscuro a temperatura de 2-8°C. Evitar la exposición prolongada o repetida a altas temperaturas ambientales luego de su extracción del refrigerador. En días calurosos, la potencia de la vacuna puede verse severamente reducida dentro de unas pocas horas. El solvente puede ser conservado a temperatura ambiente.

**Presentación:**

Caja con 25 viales por 1 dosis.

**Uso veterinario. Venta bajo receta.**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.**

Elaborado en Holanda.



Certificado N°: 10-167

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.