



FICHA TÉCNICA

Scalibor® Protecto Band Collar antiparasitario para perros

Composición:

Cada collar de 65 cm contiene:

Deltametrina* 1 g

Excipientes c.s.p 25 g

* 3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil-ciclopropano carboxilato de alfa-ciano-fenoxibencilo

Indicaciones de uso:

Control de flebótomos vectores de leishmaniasis en perros (*Lutzomyia spp.* y *Phlebotomus spp.*) durante 12 meses: eficacia probada de 94% al término de dicho período.

Control de infestaciones por garrapatas durante 6 meses.

Control de mosquitos durante 6 meses como ayuda en la prevención de la dirofilariasis.

Especies de destino:

Caninos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Retirar el collar del envoltorio protector. Colocarlo alrededor del cuello del animal sin ajustarlo demasiado. Pasar el extremo suelto del collar a través de la hebilla dejando un extremo suelto de 5 centímetros y cortar el excedente. El collar debe quedar lo suficientemente suelto como para permitir la introducción de dos dedos entre el collar y el cuello del animal.

El collar es inodoro y por lo tanto no genera rechazo en el animal. Los animales provistos del collar pueden ser tocados normalmente, incluso por niños.

Contraindicaciones:

No utilizar en cachorros de menos de 7 semanas de edad.

No utilizar en perros con lesiones extensas en la piel.

No utilizar en animales con hipersensibilidad a los piretroides.

No utilizar en gatos.

Luego de la colocación del collar se requiere de 1-2 semanas para alcanzar las concentraciones máximas en la piel.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

En caso de pérdida del collar, reemplazarlo inmediatamente de forma de mantener la eficacia del tratamiento. El collar permanece completamente efectivo en caso de que el animal entre contacto con el agua (lluvia, zambullidas). El baño con champú puede disminuir temporalmente la eficacia del producto.

En caso de ingestión accidental del collar podrían observarse los siguientes signos clínicos: movimientos incoordinados, temblor, hipersalivación, vómitos, rigidez de los miembros posteriores. Estos signos normalmente desaparecen dentro de las 48 horas. En caso necesario se puede administrar diazepam para el tratamiento sintomático.

Uso durante la preñez y lactación: No se han observado signos clínicos en hembras gestantes provistas del collar durante toda la gestación y lactación. Tampoco se han observado signos clínicos en los cachorros de madres tratadas hasta el destete.



FICHA TÉCNICA

Lavarse bien las manos con agua fría y jabón luego de la manipulación del collar.
Evitar que los niños toquen, jueguen o se introduzcan el collar en la boca, particularmente aquellos menores de 2 años.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No utilizar con otros antiparasitarios externos que contengan organofosforados.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

La deltametrina es tóxica para peces, otros organismos acuáticos y abejas. Eliminar el collar usado evitando el contacto con cursos de agua y de acuerdo a la legislación local vigente.

Almacenamiento:

Conservar a temperatura ambiente (15-25°C) protegido de la luz.

Presentación:

Estuche conteniendo un collar de 65 cm. Uso externo exclusivo. Venta libre (en locales con asesoramiento veterinario).

Elaborado en: Francia.

Para uso veterinario únicamente.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.



Certificado N° 07-269

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.