

## FICHA TÉCNICA

### Nobivac EDGE® DAPPv+L4

Vacuna liofilizada combinada a virus vivo modificado contra el distemper, adenovirus tipo 2, parainfluenza, parvovirus y *Leptospira interrogans* serovares Canicola, Icterohaemorrhagiae, Pomona y Grippytyphosa.

#### Composición:

Virus vivos modificados: Virus del Distemper Canino, Adenovirus Canino Tipo 2, Virus de la Parainfluenza Canina y Parvovirus canino.

Bacterina inactivada: *Leptospira interrogans* serovares Canicola, Icterohaemorrhagiae, Pomona y Grippytyphosa.

#### Indicaciones:

La vacuna Nobivac Edge™ DAPPv+L4 es una vacuna de virus vivos modificada que es recomendada para la vacunación de perros sanos, desde las 8 semanas de edad, contra el virus del moquillo canino, adenovirus canino tipo 2 (hepatitis), virus de parainfluenza canina, parvovirus canino, *Leptospira Canicola*, *L. Icterohaemorrhagiae*, *L. Pomona* y *L. Grippytyphosa*.

Este producto es efectivo contra la mortalidad y leptospiuria (eliminación de *Leptospira* en orina) causadas por *L. Canicola*, *L. Icterohaemorrhagiae*, *L. Pomona* y *L. Grippytyphosa*.

#### Especies de destino:

Caninos.

#### Dosis:

Inyectar una dosis (0,5 ml) por vía subcutánea.

#### Instrucciones de uso:

Agitar el vial de Nobivac Edge™ Lepto4 y transferir su contenido al vial de Nobivac Edge™ DAPPv de forma aséptica. Mezclar suavemente hasta que este disuelto. Utilizar todo el contenido de inmediato después de la rehidratación.

#### Calendario de vacunación

Vacunación básica: La dosis inicial puede ser administrada a las 8 semanas de edad o más. Repetir 2-4 semana luego de la primer vacunación. Dos dosis son requerido para la inmunización primaria. Revacunar anualmente.

#### Reacciones adversas

En casos raros, una reacción de hipersensibilidad aguda transitoria (anafilaxis), fiebre, letargo, edema facial, vómito o diarrea pueden ocurrir poco después de la vacunación.

Los datos indican que el desarrollo de opacidad de la córnea no está asociado con el uso de este producto.

#### Precauciones:

- Almacenar de 2° a 8°C. No congelar.
- Utilizar agujas y jeringas nuevas, no esterilizadas químicamente.
- No mezclar con otras vacunas.

**FICHA TÉCNICA**

- Vacunar solamente perros sanos y desparasitados.
- No vacunar hembras gestantes.
- El uso de un producto puede producir anafilaxia y/u otras reacciones de hipersensibilidad inflamatorias inmunomediadas. Antídoto: La epinefrina, corticosteroides y antihistamínicos pueden estar indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.
- La edad en la cual los anticuerpos maternos para el parvovirus canino ya no interfieren con el desarrollo de la inmunidad activa varía de acuerdo con el título de la madre y la cantidad de anticuerpos en el calostro absorbido por el cachorro.
- Contiene gentamicina y anfotericina B como conservador.
- Los envases utilizados deben ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.
- Utilizar inmediatamente una vez disuelto.

**Almacenamiento:**

Almacene de 2° a 8°C. No congelar la vacuna.

**Presentación:**

Un vial contiene la fracción liofilizada y otro vial contiene la fracción líquida como diluyente.

**Uso veterinario.**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.**

**Elaborado por:**

Intervet Inc., Omaha, NE 68103 EE.UU.

V L N /PCN 165A/47K1.21



Certificado N° 18-009

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.