

FICHA TÉCNICA
Porcilis® Ery + Parvo + Lepto
Suspensión para inyección.

Fórmula composición por dosis:

Cepas inactivadas de:	Cantidad por dosis ¹	
<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	300 mg	≥1ppd ²
Parvovirus porcino	300 U	≥65 U/ml ³
<i>Leptospira</i>		
Canicola (serovar Portland-Vere),	6250 U	≥1408 U/ml ³
Icterohaemorrhagiae (serovar Copenhageni)	520 U	≥105 U/ml ³
Australis (serovar Bratislava)	2380 U	≥852 U/ml ³
Grippotyphosa (serovar Dadas)	1086 U	≥324 U/ml ³
Pomona (serovar Pomona)	500 U	≥83 U/ml ³
Tarassovi (serovar Gatuni)	500 U	≥138 U/ml ³

¹ cantidades de antígeno por dosis

Adyuvante: Acetato de dl-α-tocoferilo

Excipientes c.s.p.

Indicaciones de uso:

Para la inmunización activa de cerdas multiparas y nulíparas:

- contra problemas reproductivos provocados por Parvovirus porcino y *Leptospira* serogrupo Pomona serovar Pomona.
- para reducir los síntomas clínicos provocados por *Erysipelotrix rhusiopathiae* y *Leptospira* serogrupo Canicola serovar Canicola y serogrupo Pomona serovar Pomona.
- para reducir la infección provocada por *Leptospira* serogrupo Canicola serovar Canicola, *Leptospira* serogrupo Icterohaemorrhagiae serovares Icterohaemorrhagiae y Copenhageni, *Leptospira* serogrupo Australis serovar Bratislava, *Leptospira* serogrupo Grippotyphosa serovares Grippotyphosa y Bananal/Liangguang y *Leptospira* serogrupo Tarassovi serovares Tarassovi y Vughia.
- para reducir la excreción de *Leptospira* serogrupo Canicola serovar Canicola.

Inicio de la inmunidad:

Erysipelotrix rhusiopathiae: 3 semanas.

Parvovirus porcino: 10 semanas.

Serogrupos *Leptospira*: 2 semanas.

Duración de la inmunidad:

Erysipelotrix rhusiopathiae y *Leptospira* serogrupo Australis: 6 meses.

Parvovirus porcino, *Leptospira* serogrupos Canicola Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Pomona y Tarassovi: 12 meses.

Especie de destino:

Porcinos.

FICHA TÉCNICA**Contraindicaciones:**

Ninguna.

Reacciones adversas:

Puede presentarse un aumento transitorio de la temperatura corporal de 0,5°C que puede durar hasta dos días después de la vacunación. En casos específicos pueden observarse reacciones sistémicas intermedias que remiten en pocos minutos. También pueden ocurrir reacciones locales pasajeras en la zona inyectada.

Especies de destino:

Cerdos.

Posología y vía de administración:

Inyección intramuscular para cerdos. Una dosis equivale a 2 ml.

Programa de vacunación:

Vacunación básica: Las cerdas que no han sido vacunadas con Porcilis Ery+Parvo+Lepto deben recibir una primera inyección de 6 a 8 semanas antes de la fecha prevista para la inseminación y una dosis de refuerzo 4 semanas más tarde.

Revacunación: Se debe aplicar una dosis sencilla de Porcilis Ery+Parvo+Lepto una vez al año, suplementada con un producto que contenga *Erysipelotrix rhusiopathiae* 6 meses después de cada vacunación con Porcilis Ery+Parvo+Lepto para mantener la inmunidad contra *Erysipelotrix rhusiopathiae*.

Consejos para una correcta administración:

Antes del uso de la vacuna permita que esta alcance temperatura ambiente y agítela antes de su uso. No permita el ingreso de agentes contaminantes.

Período de retiro:

Cero.

Precauciones para su almacenamiento:

Conservar a una temperatura de 2 °C – 8 °C. No congelar. Proteger de la luz.

No utilizar el producto una vez transcurrida la fecha de vencimiento que figura en la etiqueta. Una vez abierto el envase utilizar el contenido antes de las 10 horas.

Advertencias:

Vacune sólo animales sanos. Puede aplicarse durante la preñez.

En caso de inyectarse accidentalmente, consulte de inmediato a un médico y muéstrela el prospecto del empaque o la etiqueta. No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con cualquier otro medicamento de uso veterinario. Por lo tanto, la decisión de usar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario se debe tomar dependiendo de cada caso.

No mezclar con otro producto veterinario.

Elaborado en: Holanda

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.



FICHA TÉCNICA



Certificado N° 19-055

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.