

## FICHA TÉCNICA

**PORCILIS® PCV ID**  
Vacuna subunitaria inactivada contra  
Circovirus Porcino tipo 2  
Emulsión inyectable

**Composición:**

Cada dosis de 0,2 ml contiene:

Antígeno subunitario ORF 2, Circovirus Porcino tipo 2,

Cepa MSV-BAC/PCV2-ORF2; 98-99

≥1436 AU<sup>1</sup>

Excipientes c.b.p.

0,2 mL

Adyuvantes: DI- $\alpha$ -tocoferol acetato y parafina líquida ligera

<sup>1</sup> Unidades de masa antigénica determinadas en la prueba de potencia in vitro

**Indicaciones de uso:**

Inmunización activa, para reducir la viremia y la carga viral en pulmón y tejidos linfoides causados por Circovirus Porcino Tipo 2 (PCV2). Además, para reducir la pérdida de ganancia diaria de peso y la mortalidad asociada a la infección por PCV2.

Desarrollo de la inmunidad: 2 semanas post vacunación.

Duración de la inmunidad: 23 semanas post vacunación.

**Especies de destino:**

Cerdos, a partir de las 3 semanas de edad.

**Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:**

Posología: Administrar 0,2 mL; como dosis única.

Edad o peso:

A partir de las 3 semanas de edad.

Condición fisiológica:

Vacunas solo animales sanos.

Vía de administración:

Intradérmica, de preferencia a los costados del cuello, en los músculos de la espalda o en el muslo utilizando un dispositivo de inyección multidosis, sin aguja, para aplicación intradérmica de líquidos y adecuado para entregar un volumen de vacuna (0,2 mL $\pm$ 10%) a través de las capas epidérmicas de la piel. La seguridad y eficacia de Porcilis® PCV ID ha sido demostrada utilizando el dispositivo IDAL.

Modo de empleo:

Antes de usar permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente. Agitar antes de usar. Administrar en forma aséptica.

**Contraindicaciones:**

No vacunar verracos, hembras gestantes ni en el periodo de lactancia.

## FICHA TÉCNICA

---

### **Interacciones con otros productos farmacéuticos:**

Existen datos disponibles sobre seguridad y eficacia que demuestran que esta vacuna puede administrarse junto con **Porcilis® M Hyo ID ONCE, SENASA Cert. N° 17-033**, en el mismo día con al menos 3 cm de separación desde las 3 semanas de edad. En el caso que se utilicen ambas vacunas el mismo día, el tamaño de la reacción local puede aumentar hasta 6 cm en forma individual y puede durar hasta 5 semanas. Por otra parte, es común observar un aumento de la temperatura corporal el día de la vacunación de 0,2°C. En cerdos individuales, la temperatura puede aumentar hasta 2°C. Los animales vuelven a la normalidad 1 a 2 días después que el peak de temperatura fue observado.

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

### **Efectos no deseados o reacciones adversas:**

Es muy frecuente (>1 de cada 10 animales vacunados) observar reacciones locales transitorias que consisten en una inflamación dura, no dolorosa, de un diámetro de hasta 2 cm con un patrón bifásico común que consiste en un aumento y disminución seguido por otro aumento y disminución del tamaño de la reacción local. En forma individual, el tamaño puede aumentar a 4 cm y se puede observar enrojecimiento. Las reacciones locales desaparecen completamente dentro de aproximadamente 5 semanas post vacunación.

### **Precauciones especiales para el operador:**

Este producto contiene aceite mineral. Una inyección accidental o auto inyección accidental pueden resultar en dolor severo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en casos raros, puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no acude a atención médica de inmediato. Buscar atención médica de inmediato aunque sólo sea una pequeña cantidad inyectada y lleve el prospecto interno con usted. Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque atención médica otra vez.

### **Principales incompatibilidades:**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico; salvo con la vacuna señalada en Interacciones.

### **Advertencias y precauciones especiales de uso:**

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

### **Período de resguardo:**

Cero días.

### **Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar en refrigeración entre 2°C a 8°C. No congelar. Protéjase de la luz directa del sol. Una vez abierto el envase, utilice el contenido dentro de las 8 horas siguientes.

## FICHA TÉCNICA

---

**Presentación:**

Caja con 1 o 10 viales de vidrio de 10 ml. Caja con 1 o 10 viales de plástico de 20 ml.

**Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración:**

Los envases utilizados deben ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

**Fabricado por:**

Intervet International BV.  
Wim de Körverstraat 35,  
5831 AN Boxmeer, Holanda

### VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

**Intervet Argentina S.A.**

Cazadores de Coquimbo 2841  
(B1605 AZE), Munro, Bs. As.  
Tel +5411-6090-7200  
Director Técnico Eduardo V. López  
Méd. Vet. MPBA 4505

 SENASA CERTIF. N° 22-026  
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES  
ARGENTINA: 0800 333 0160

USO VETERINARIO