

Porcilis® Glässer

Vacuna contra la enfermedad de Glässer del ganado porcino.

Composición:

Cada dosis de 2 mL contiene un concentrado de células enteras inactivadas de *Glaesserella parasuis* (antes *Haemophilus parasuis*) cepa 4800, serotipo 5, conteniendo 0.05 mg TN. El antígeno se incorpora a un adyuvante compuesto por dl- α -tocoferol.

Indicaciones:

Inmunización activa de cerdos de engorde para la protección frente a los signos clínicos de la enfermedad de Glässer causada por *Glaesserella parasuis* serotipo 5 e inmunización pasiva de la progenie de cerdas vacunadas para la reducción de signos clínicos y mortalidad causados por *Glaesserella parasuis* serotipo 4 y 5.

Especie de destino:

Porcinos.

Programa de vacunación:

Esquema de vacunación en cerdos:

Vacunar cerdos de al menos cinco semanas de edad; administrar la vacuna dos veces con un intervalo de dos semanas.

Esquema de vacunación en madres:

Vacunar cerdas 6 a 8 semanas antes de la fecha estimada de parición, dos veces con un intervalo de cuatro semanas.

Esquema de revacunación en madres:

En cerdas vacunadas en preñeces anteriores, se recomienda una revacunación simple 4 a 2 semanas antes del parto.

- Agite el frasco antes de administrarla.
- Utilice un equipo de vacunación estéril.
- Se recomienda inyectar la vacuna detrás del pabellón auricular del animal.
- Espere a que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15-20°) y agite el frasco antes de administrarla.

Dosis y administración:

Inyección intramuscular de 2 mL en el cuello del cerdo.

Efectos secundarios:

Durante las horas siguientes a la vacunación puede observarse un ligero aumento de la temperatura unido a signos de malestar general.

Entre la vacunación y el sacrificio de los animales para el consumo humano se deben esperar:

cero días.

Conservación:

Conservar entre 2°C y 8°C. No congelar.

FICHA TÉCNICA

Advertencias:

- No administrar junto con otros medicamentos.
- Tiempo de conservación una vez abierto: 3 horas.
- En caso de autoinyección o ingestión accidental, acuda al médico de inmediato y muéstrele al prospecto o la etiqueta del producto.
- Todo el producto no utilizado y los envases deben ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

Elaborado en: Holanda

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta
Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.



Certificado N° 22-027

Importado y comercializado por:
Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,
Méd. Vet. MPBA 4505.