

FICHA TÉCNICA**Nobivac® LEPTO**

Vacuna inactivada bivalente desarrollada para la protección de caninos contra la leptospirosis causada por *Leptospira interrogans* serovares *canicola* e *icterohaemorrhagiae* y contra el desarrollo del estado de portador renal.

NOBIVAC LEPTO es una vacuna inactivada bivalente desarrollada para la protección de caninos contra la leptospirosis causada por *Leptospira interrogans* serovares *canicola* e *icterohaemorrhagiae* y contra el desarrollo del estado de portador renal. Luego del esquema de vacunación inicial los animales están protegidos por un período de un año.

Composición:

Cada dosis contiene *L. interrogans* serovar *canicola* cepa Ca-12-000 \geq 957 unidades/ml

L. interrogans serovar *icterohaemorrhagiae* cepa 820k \geq 625 unidades/ml.

Expresado en unidades/ml de masa antigénica por ELISA.

Indicaciones de uso:

Inmunización activa de perros contra la leptospirosis causada por *Leptospira interrogans* serovares *canicola* e *icterohaemorrhagiae* y protección contra el estado de portador renal.

Especies de destino:

Caninos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Agitar bien antes de usar. Administrar por vía subcutánea en la región del cuello o tórax tomando las precauciones habituales de asepsia. Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15-25°C) antes de la administración.

Nobivac Lepto puede utilizarse en forma segura en hembras gestantes.

Nobivac Lepto es compatible con todas las vacunas liofilizadas de Intervet.

Vacunación básica:

Todos los perros que no hayan sido vacunados previamente deben ser vacunados dos veces con un intervalo de 2-4 semanas. Los cachorros deben tener al menos 8 semanas al momento de la primera vacunación.

Revacunación:

Luego de la vacunación básica, una sola dosis anual es suficiente para proteger a los animales durante un año contra la leptospirosis, así como contra el desarrollo del estado de portador renal de *L. interrogans* serovares *canicola* e *icterohaemorrhagiae*.

Contraindicaciones:

Sólo deberán vacunarse perros en buen estado de salud luego de un examen clínico apropiado.

Deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta completado el plan básico de vacunación.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Utilizar equipo estéril para la administración de la vacuna.



Nobivac® LEPTO
Administración parenteral

FICHA TÉCNICA

Efectos no deseados o reacciones adversas:

Ocasionalmente puede producirse una leve reacción de hipersensibilidad que es autolimitante.

En el sitio de inyección se puede producir una reacción local de tamaño limitado durante los primeros días después de la vacunación. Esta reacción puede evolucionar a una afección más grave (anafilaxia), que puede poner en peligro la vida. En casos muy raros, se han informado signos clínicos de anemia hemolítica inmunomediada, trombocitopenia inmunomediada o poliartritis inmunomediada.

Almacenamiento:

Conservar en lugar oscuro a 2-8°C. No congelar.

Presentación:

Caja de 10 viales de 1 ml.

Uso veterinario. Venta bajo receta-

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

Elaborado en Holanda.



Certificado N°: 98285

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.