

Porcilis® Begonia DF

Liofilizado y diluyente para suspensión inyectable intramuscular en cerdos

COMPOSICIÓN:

Por dosis de 2 mL:

Liofilizado: Virus vivo de la Enfermedad de Aujeszky cepa Begonia (gE⁻, tK⁻): 10^{5.5} – 10^{6.5} TCID₅₀*. Disolvente: Acetato de dl- α -tocoferilo: 75,0 mg/mL (adyuvante).

*TCID₅₀: Dosis infectiva de cultivo tisular 50%

INDICACIONES:

Inmunización activa de cerdos frente a la Enfermedad de Aujeszky para prevenir la mortalidad y los síntomas clínicos, además de reducir la replicación del virus de la Enfermedad de Aujeszky.

Inicio de la inmunidad: 3 semanas.

Duración de la inmunidad: aproximadamente 4 meses.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

REACCIONES ADVERSAS:

En raras ocasiones puede aparecer una reacción alérgica (hipersensibilidad). En tales casos, el veterinario puede administrar un tratamiento adecuado (antihistamina, adrenalina), si es necesario. En algunos animales vacunados puede producirse un ligero aumento de la temperatura corporal durante aproximadamente 7 horas a un día. Durante los estudios de seguridad no se observan reacciones locales o estas fueron muy limitadas (reacción inflamatoria de \leq 2 cm aproximadamente durante 14 días en 7 de los 10 animales).

En el perro (que no es una especie de destino) pueden aparecer síntomas neurológicos tras la inyección intramuscular. Tras la administración oral en perros no se observan reacciones adversas. A dosis 10 veces superior a la máxima, los síntomas no difieren de los mencionados tras la administración de una sola dosis.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

ESPECIE DESTINO:

Cerdos.

ADMINISTRACIÓN:

Administrar una dosis de 2 ml por vía intramuscular en los músculos del cuello.

POSOLÓGIA MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Reconstituir la fracción liofilizada con 2 ml de diluyente por dosis. Tras la reconstitución, administrar una dosis de 2 ml del producto por vía intramuscular, utilizando un dispositivo de inyección intramuscular.

Programa de vacunación:

- *Cerdos de engorde:*

Cuando los cerdos son vacunados a partir de las 14 semanas de edad, no es necesaria la revacunación.

En situaciones con riesgo de infección temprana, los cerdos pueden ser vacunados a las 10 semanas de edad, pero deben ser revacunados a una edad mínima de 14 semanas, con un intervalo de al menos 2 semanas desde la primera vacunación, puesto que la presencia de anticuerpos maternos frente a la Enfermedad de Aujeszky puede presentar una influencia negativa sobre el resultado de la vacunación temprana.

- *Cerdos reproductores:*

FICHA TÉCNICA

Vacunación básica igual que los cerdos de engorde.

Revacunación a intervalos de 4 meses, 3 veces al año como vacunación de un lote.

- *Programa de erradicación:*

Cuando se utiliza en programas de erradicación, debe seguirse el programa de (re)vacunación adecuado.

INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Una vez reconstituida, utilizar antes de las 8 horas.

TIEMPO DE ESPERA:

Cero días.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Fracción liofilizada: Conservar entre 2°C y 8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Diluyente: Conservar a temperatura inferior a 25°C. No congelar.

Tras la reconstitución: Conservar en nevera entre 2-8°C.

No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

ADVERTENCIAS ESPECIALES:

Los cerdos menores de 3 meses de edad, con anticuerpos maternos, pueden necesitar revacunación (ver programa de vacunación).

Esta vacuna puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.

No existe información disponible sobre la seguridad y la eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro medicamento veterinario. La decisión sobre el uso de esta vacuna antes o después de la administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

No mezclar con ningún otro medicamento veterinario, excepto el disolvente suministrado para su uso con el medicamento.

No usar en perros.

En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La cepa del virus es timidina kinasa y glicoproteína gE negativo (tk⁻, gE⁻), genéticamente estable y no persiste en el cerdo. La vacunación permite la discriminación con respecto a las infecciones de campo (vacuna marcada). El diluyente presenta propiedades adyuvantes.

Los envases utilizados deben ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Ctro. Nac. de Intox. 08003330160

Elaborado en Países Bajos

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841

(B1605AZE)

Munro – Buenos Aires.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, Méd. Vet. MPBA 4505.



Porcilis® Begonia
Inyección intramuscular

FICHA TÉCNICA



Certificado N° 24-201