

Vacuna viva contra
Bordetella bronchiseptica

Perros. Para la administración oral.

Ver prospecto adjunto. Mantener refrigerado: entre 2 - 8°C.

Nobivac® **Intra-Trac® Oral Bb**

USO VETERINARIO

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria

Nobivac

MSD Salud Animal

Nobivac® Intra-Trac® Oral Bb
5 x 1 dosis
Polvo liofilizado para Suspensión Oral

Perros
Para la administración oral.
Composición
Cada dosis contiene:
Bordetella bronchispetica, cepa B-C2 ≥1 x 10^9 CFU/dosis
Excipientes c.s.p. 1 mL
Diluyente: Agua purificada.

Indicaciones de uso: Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina o Tos de las perreras.
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo
Dosis: 1 mL.
Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento: Se recomienda revacunación anual con 1 dosis.
Edad o peso: A partir de las 7 semanas de edad.
Condición fisiológica: Animales sanos y desparasitados.
Vía de administración: Oral.

Modo de empleo: Reconstituir asépticamente la vacuna deshidratada con el diluyente proporcionado.
Agitar bien antes del uso. Retirar la aguja y administrar 1 mL en la cavidad bucal. Utilizar agujas nuevas, no esterilizadas químicamente.
Contraindicaciones: No se han descrito.
Efectos adversos o reacciones adversas: El uso de esta vacuna puede producir ocasionalmente anafilaxis y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad inmunomediadas. Antídoto: Epinefrina, corticoesteroides y antihistamínicos, pueden estar indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

Advertencias y precauciones especiales de uso: Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Condiciones de almacenamiento: Mantener refrigerado: entre 2 - 8°C. Diluyente: puede ser almacenado a temperatura ambiente (15-25°C).
Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores: No vacunar hembras gestantes ni durante la lactancia.
Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración: Los envases y todo contenido sin usar deben ser dispuestos acorde con la legislación local.

Utilizar todo el contenido inmediatamente después de la rehidratación.
Lavarse y desinfectarse las manos después de la vacunación.
En caso de auto inyección o de ingesta accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta al doctor.
Vacune únicamente animales sanos y desparasitados.

Fabricado por:
Intervet Inc.
21401 West Center Road Elkhorn, Nebraska 68022, USA VLN 165A/PCN 1081.02

Importado y Distribuido por:
Argentina:
Intervet Argentina S.A. Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.
SENASA CERT. N°: 21-007
Ctro. Nac. de Intoxicaciones 08003330160
Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.