

**FICHA TÉCNICA****Breedervac Reo-Plus™**

Vacuna contra la enfermedad de Gumboro y Reovirus Aviar

**COMPOSICIÓN:**

Contiene:

Gumboro, cepa estándar	≥ 200 EU
Gumboro, Variante A	≥ 22.73 mg
Gumboro, Variante GLS-5	≥ 200 EU
Gumboro, Variante E	≥ 0.1 mg
Reovirus cepa 1733	≥ 6.36 mg
Reovirus cepa 2408	≥ 6.36 mg

**Excipientes c.s.p.** 1 dosis.

Está vacuna se prepara utilizando substratos libres de patógenos específicos (SPF) o substratos aprobados y contiene una cepa estándar y las variantes GLS y Delaware (A y E) del virus de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa y dos cepas de Reovirus Aviar (1733 y 2408) inactivados y en suspensión en la fase acuosa de una emulsión de adyuvante oleosa.

**INDICACIONES PARA EL USO:**

Está vacuna se recomienda para la vacunación de pollos sanos de 3 semanas de edad o mayores como una ayuda para prevenir la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa (estándar; y variantes Delaware y GLS) y las enfermedades causadas por Reovirus. La fracción de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa es usada primordialmente para la protección temprana de la progenie con anticuerpos maternos y la fracción de Reovirus es usada para proteger a la gallina contra la tenosinovitis y a la progenie contra el Síndrome de Mala absorción.

**ADMINISTRACIÓN:**

Permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente de 16° y 27°C (60° y 80°F), sacuda bien antes de usar y periódicamente durante su uso. Inyectar 0.5 ml por vía intramuscular o subcutánea en pollos, utilizando agujas de medida 18 x 1/2" o 1/4".

**PROGRAMA DE VACUNACIÓN:**

Aunque esta vacuna se puede usar para vacunación primaria a las tres semanas de edad o mayores, la evidencia disponible sugiere que la mejor protección se obtiene cuando se usa para vacunar pollos previamente inmunizados con vacunas de virus vivo del mismo tipo.

Ejemplos: Aves reproductoras.

Vacunación primaria con la vacuna viva modificada atenuada del Reovirus en aves antes de las 12 semanas de nacidos.

Vacunación primaria con la vacuna a virus vivo de la enfermedad Bursal, antes de las 12 semanas de edad. La vacunación con BREEDERVAC REO-PLUS se llevará a cabo entre las 16 y 22 semanas de edad, después de las vacunaciones primarias. Se debe esperar un período mínimo de cuatro semanas entre la última vacunación con virus vivo y la inyección con BREEDERVAC REO-PLUS.

Las condiciones locales deberán ser consideradas y cuando sea necesario consulte al veterinario.

## FICHA TÉCNICA

---

### **INMUNIDAD:**

Es evidente que para que haya una protección óptima, se deben de haber efectuado vacunaciones previas con vacunas vivas. Por lo general, las parvadas vacunadas con BREEDERVAC REO-PLUS desarrollarán un nivel protector de inmunidad, cuya variación entre ave y ave deberá ser mínima.

### **ADVERTENCIA:**

1. **SE DEBE TENER UN CUIDADO EXTREMO AL INYECTAR VACUNAS EN EMULSIÓN OLEOSA PARA EVITAR LA INOCULACIÓN DE PERSONAS. LA INYECCIÓN ACCIDENTAL DE PERSONAS PUEDE CAUSAR REACCIONES LOCALES SEVERAS. EN CASO DE OCURRIR LA INYECCIÓN ACCIDENTAL DE ALGUNA PERSONA SE DEBE CONTACTAR A UN MÉDICO INMEDIATAMENTE.**
2. No administre esta vacuna durante el periodo crítico de postura, desde el inicio hasta el pico de producción. La administración de este producto durante el periodo de postura podría resultar en una baja de la producción de huevo.
3. La inyección de la vacuna inactivada en el músculo de la pechuga puede crear problemas en la planta procesadora bajo ciertas condiciones.
4. No vacune los pollos durante los 42 días antes del sacrificio.
5. Esta vacuna contiene gentamicina, neomicina y timerosal como conservantes.
6. No mezcle esta vacuna con otras sustancias.
7. Use todo el contenido del frasco al abrir.
8. Asegúrese de que el equipo de vacunación esté limpio y estéril antes de usarlo.
9. No use equipo de vacunar con piezas de goma ya que la emulsión de aceite podría afectar ciertos tipos de goma.
10. El uso de cualquier tipo de vacuna inactivada puede provocar resultados falsos positivos en las pruebas de aglutinación en placa para *Mycoplasma*. Evite toda prueba de *Mycoplasma* antes de 10 semanas post-vacunación.
11. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
12. Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.
13. **PARA USO ANIMAL SOLAMENTE**

**AVISO:** Esta vacuna ha sido sujeta a pruebas estrictas de potencia, inocuidad y pureza y cumple con los requisitos impuestos por Intervet Inc. y regulaciones locales y federales de EE.UU. La vacuna está diseñada para estimular una inmunidad eficaz cuando se le utiliza según lo indicado en las instrucciones, pero el usuario debe de saber que la respuesta al producto depende de muchos factores que incluyen, pero no se limitan a, su almacenamiento y manejo, la administración de la vacuna, salud y sensibilidad individual de las aves y el grado de exposición de campo. Por lo tanto, las instrucciones deben de seguirse detenidamente. Este producto no es perjudicial si se utiliza de acuerdo a las instrucciones proporcionadas.

**REGISTROS:** Mantener un registro de la vacuna, cantidad, número de serie, fecha de vencimiento y lugar de la compra, fecha y hora de la vacunación, el número, edad, raza y ubicación de las aves y nombres de los operarios que administraron la vacuna y cualquier reacción observada.

Los envases utilizados deben ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.

## FICHA TÉCNICA

---

**Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.**  
**Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**  
**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.**  
**Elaborado en Estados Unidos.**



Cert. N°: 25-037

**Importado y distribuido por:**  
Argentina: Intervet Argentina S.A.  
Cazadores de Coquimbo 2841  
(B1605AZE) Munro - Buenos Aires.  
Dir.Téc.: Eduardo V. López,  
Médico Veterinario, MPBA 4505.