

Nobilis® MG 6/85Contiene la cepa MG 6/85 de *Mycoplasma gallisepticum***FÓRMULA:**

Cada dosis de 0,03 mL contiene:

Mycoplasma gallisepticum cepa MG 6/85 (cultivo activo atenuado) 10^{7.0} CFU

Excipiente c.b.p 1 dosis (0,03 mL)

INDICACIONES:Para la inmunización activa de aves sanas contra la infección por *Mycoplasma gallisepticum*.**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Aspersión por gota fina.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Para desarrollar un programa de vacunación específico para una granja o un complejo avícola, se deben tomar en consideración diversos factores. A fin de lograr una efectividad total, la vacunación debe administrarse correctamente en aves sanas de 6 a 12 semanas de edad, que se encuentren en un ambiente apropiado y bajo buenas condiciones de manejo. Además, la respuesta inmune puede ser influenciada por la edad y el estado inmunológico de los animales.

El nivel de inmunidad requerido variará de acuerdo a las prácticas operacionales y el grado de exposición.

PREPARACIÓN DE LA VACUNACIÓN:**NO ABRA O PREPARE LA VACUNA HASTA EL MOMENTO DE COMENZAR LA VACUNACIÓN. UNA VEZ PREPARADA, LA VACUNA DEBERÁ UTILIZARSE INMEDIATAMENTE.**

1. Desprenda el sello y quite el tapón del vial que contiene la vacuna.
2. Vierta cuidadosamente agua limpia, fresca, no clorada y de preferencia destilada, en el vial hasta llenarlo a 2/3 de su capacidad.
3. Inserte el tapón y agite vigorosamente hasta que todo el material se disuelva.
4. La vacuna está lista para su aplicación por aspersión, de acuerdo a las siguientes indicaciones.

VACUNACIÓN POR ASPERCIÓN DE GOTA FINA. - Para pollitas de 6 a 12 semanas de edad.

1. La vacunación por aspersión deberá ser con gota fina menos o igual a 20 micrones.
2. No use desinfectante ni leche descremada en el aspersor.
3. Use el aspersor solo para la administración de vacunas. Límpielo bien después de cada uso. Se recomienda el uso de Clean Tabs®.
4. Apague los ventiladores durante la vacunación. Enciéndalos inmediatamente después de la aspersión. Hay que tener precaución en climas cálidos.
5. Aplique la vacuna caminando lentamente dentro de la caseta.
6. Siga las recomendaciones del fabricante del aspersor sobre el volumen de agua.
7. Use solamente agua limpia, fresca y no clorada (preferentemente desitlada).
8. Los operadores deben usar máscara y lentes protectores.

ADVERTENCIA:

- Vacunar solamente aves sanas y LIBRES de *Mycoplasma gallisepticum*.
- Todos los animales sanos deben vacunarse al mismo tiempo.
- Evite la medicación de las aves con antibióticos 5 días antes y 5 días después de la vacunación, especialmente con clortetraciclina, oxitetraciclina y sulfonamidas.

FICHA TÉCNICA

- La cepa MG 6/85 de Mycoplasma gallisepticum no es patógena para pavos, pero se debe tener cuidado en la aplicación de la vacuna, en el manejo de las pollas, así como en la bioseguridad.
- Se debe reducir las condiciones de estrés al momento de vacunación y durante la post vacunación.
- No mezclar, no rociar o verter esta vacuna con ninguna sustancia.
- La vacuna debe ser aplicada dejando un período de 2 semanas entre cualquier vacunación a virus activo contra Newcastle, Bronquitis Infecciosa o Laringotraqueítis.
- Los datos de seguridad y eficacia demuestran que Nobilis® MG 6/85 puede mezclarse y administrarse a partir de las seis semanas de edad con Nobilis® MS Live. Consultar con el instructivo de Nobilis® MS Live antes de administrar el producto.
- No aplique menos de 1 dosis por ave.
- Use todo el contenido del vial una vez abierto.
- No vacunar dentro de las 4 semanas previas al rompimiento de postura o después del inicio de esta.
- Consérvese en refrigeración entre 2 y 8 °C. No congelar.
- Los envases utilizados deben ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

PRESENTACIÓN:

Caja con 10 viales de 1,000 dosis o 2,000 dosis.

VENTA BAJO RECETA

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

ELABORADO POR:

Intervet International, B.V.
Wim de Körverstraat 35,
5830 AA Boxtmeer, Países Bajos.



Cert. N°: 00-181

Importado y distribuido por:

Argentina: Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841
(B1605AZE) Munro - Buenos Aires.
Dir.Téc.: Eduardo V. López,
Médico Veterinario, MPBA 4505.