

FICHA TÉCNICA

Nobilis® SALENVAC ETC

Vacuna bacterina inactivada contra *Salmonella enteritidis*, *Salmonella typhimurium* y *Salmonella infantis*

COMPOSICIÓN:

Cada dosis contiene:

Salmonella Enteritidis inactivada, fago tipo 4 (cepa 109) $\geq 1.0 - 6.6$ R.P.*

Salmonella Typhimurium inactivada, cepa DT104 $\geq 1.0 - 16.1$ R.P.

Salmonella Infantis inactivada, cepa A, S03499-06 $\geq 1.0 - 26.6$ R.P.

Excipientes csp 0,5 mL

-Adyuvante: Hidróxido de aluminio

-Preservante: Timerosal

*R.P.: Potencia Relativa.

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de pollos para reducir la colonización y excreción fecal de *S. Enteritidis* (serogrupo D), *S. Typhimurium* y *S. Infantis*.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Además de inducir inmunidad activa contra *S. Enteritidis* (serogrupo D), *S. Typhimurium* y *S. Infantis* existe inmunidad cruzada, en forma secundaria, contra *S. Heidelberg* (serogrupo B), *S. Hadar* y *S. Virchow* (serogrupo C).

ESTABLECIMIENTO DE LA INMUNIDAD (DESPUÉS DE LA SEGUNDA VACUNACIÓN)

- *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*, *S. Infantis*, *S. Hadar* y *S. Virchow*: 4 semanas.
- *S. Heidelberg*: 9 semanas*.

* Primer punto de tiempo investigado.

DURACIÓN DE LA INMUNIDAD (DESPUÉS DE LA SEGUNDA VACUNACIÓN)

- *S. Enteritidis*: 48 semanas (demostrada por desafío) y 90 semanas (demostrada por serología).
- *S. Typhimurium*: 57 semanas (demostrada por desafío) y 90 semanas (demostrada por serología).
- *S. Infantis*: 51 semanas (demostrada por desafío).
- *S. Hadar*: 51 semanas (demostrada por desafío).
- *S. Virchow*: 51 semanas (concluida de razonamiento científico).
- *S. Heidelberg*: 57 semanas (concluida de razonamiento científico).

POSOLOGÍA:

- 1° dosis: 0,5 mL a partir de las 6 semanas de edad.
- 2° dosis: 0,5 mL al menos 4 semanas después de la primera dosis. La segunda vacunación debe administrarse a más tardar 3 semanas antes del inicio de la puesta de huevos.

CONDICIÓN FISIOLÓGICA:

Animales sanos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.

FICHA TÉCNICA

MODO DE EMPLEO:

Agitar bien antes de usar.
Jeringas y agujas deben ser esterilizadas antes de su uso.
Administrar de forma aséptica.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

EFFECTOS ADVERSOS O REACCIONES ADVERSAS:

La vacunación muy comúnmente puede resultar en nódulos pequeños (de hasta 8 mm de tamaño) transitorios y palpables en el sitio de inyección. Estos nódulos desaparecen por completo dentro de 2 semanas después de la segunda vacunación. Muy frecuentemente, la vacunación puede estar asociada a efectos sistémicos leves y transitorios, como una reducción de la actividad y de la ingesta de alimentos que dura hasta 2 días después de la primera vacunación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Las medidas higiénicas y las buenas prácticas de manejo también deberían representar una parte importante del programa de control para reducir la incidencia de la infección por *Salmonella*.

Uso durante postura y en animales reproductores:

No utilizar en aves en postura.

Interacción con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Sobredosis:

No aplica.

PERÍODO DE RESTRICCIÓN

Cero días.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

En caso de auto-inyección accidental, buscar ayuda médica inmediatamente y mostrar el inserto del envase o la etiqueta al médico.

Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

PRESENTACIÓN

Frascos de 500 ml (1000 dosis).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar. Proteger de la luz solar directa.
Después de la primera apertura del envase, utilizar dentro de 10 horas.

Elaborado en MSD Animal Health UK Limited - Reino Unido

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

FICHA TÉCNICA



Certificado N° 14-068

Importado y comercializado por: Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, Méd. Vet. MPBA 4505.