

Presentamos

Nobivac® Puppy DP PLUS



La vacuna que lo cambia todo

El avance revolucionario en la
protección de los cachorros.

Protección revolucionaria para el cachorro. Eficacia sin precedentes contra el Parvovirus.

La importancia de la protección temprana



Los cachorros jóvenes tienen un **alto riesgo** de contraer enfermedades debilitantes o mortales como Parvovirus o Distemper.




La **inmunización temprana** garantiza protección y ofrece tranquilidad para realizar una socialización adecuada del cachorro.



Los anticuerpos maternos brindan protección durante las primeras semanas de vida de un cachorro, pero los niveles altos de éstos pueden interferir con la vacunación.

Elimina la ventana de susceptibilidad.



Nobivac® Puppy DP PLUS

Ciclo estándar de vacunación

Ventana de susceptibilidad

Nobivac® Puppy DP PLUS



Presentamos la primera vacuna capaz de superar cualquier nivel de anticuerpos maternos de parvovirus a partir de las cuatro semanas de edad.

Las vacunas contra el parvovirus existentes son capaces de superar niveles moderados de anticuerpos maternos. A pesar de esto, todavía puede haber una ventana de susceptibilidad, por lo que el cachorro estará en riesgo durante este tiempo.

Nobivac® Puppy DP PLUS elimina esta posibilidad.

Nobivac® Puppy DP PLUS marca una nueva era en la protección de los cachorros.




- Sin interferencia de anticuerpos maternos de parvovirus a partir de las cuatro semanas de edad¹.
- Proporciona un inicio rápido de inmunidad (3 días)¹.
- Proporciona protección de vanguardia basada en la última variante de campo CPV-2c (Parvovirus Canino).
- Brinda una protección confiable contra el moquillo².

Nobivac® Puppy DP PLUS

Una nueva tecnología que hace la diferencia

Nueva cepa de parvovirus canino: 630a

La nueva cepa 630a es una combinación de nuestra patentada cepa C154 de parvovirus (incluida en Nobivac DHPPi), con la cápside de una variante de campo CPV-2c. A su vez, dicha cápside contiene cambios en algunos aminoácidos para atenuar la cepa vacunal resultante.




Gracias a la tecnología de modificación genética se obtiene la Cepa 630a

Protección completa en presencia de Anticuerpos Maternos




Eficacia de Nobivac® Puppy DP Plus contra parvovirus a las 4 semanas de edad¹



Los títulos de AcM presentes en el grupo vacunado en algunos casos era tan altos como 1.664

Eficacia de Nobivac® Puppy DP Plus contra parvovirus a las 6 semanas de edad³



Sólo Nobivac® PuppyDP Plus superó todos los niveles de AcM.

- Nobivac® Puppy DP PLUS
- Vacuna A
- Vacuna B
- Vacuna C

Nobivac® Puppy DP PLUS hace lo que ninguna otra vacuna contra Parvovirus puede hacer.


Nobivac® Puppy DP PLUS

Protección probada y confiable contra el moquillo.



Contiene la cepa Onderstepoort, reconocida por su seguridad en perros.

Para su desarrollo **se incrementó el título de la fracción distemper en 10 veces**, logrando atravesar niveles superiores de anticuerpos maternos y **permitiendo inmunizar a una mayor cantidad de cachorros con la primera dosis.**



En un estudio de campo con Nobivac PuppyDP Plus, el 99% de los cachorros de 4-6 semanas de edad respondieron a la vacunación².

Inmunización temprana para una socialización temprana


Nobivac® Puppy DP PLUS debe ser administrada a las 6 semanas, momento donde tendremos la mayor probabilidad de inmunizar a los cachorros contra parvovirus y distemper.

En caso de alto riesgo de estas enfermedades, se recomienda aplicar una dosis adicional previamente, a las 4 semanas.

¿Cuándo se administra esta vacuna?

PERÍODO CRÍTICO DE SOCIALIZACIÓN

Semanas de vida



Nobivac® PuppyDP Plus otorga la mayor tranquilidad para lograr una socialización temprana de la forma más segura:

- Protección temprana.
- Sin interferencia de Anticuerpos Maternos de parvovirus canino¹.
- Rápido comienzo de la inmunidad (3 días para parvovirus, 7 días para distemper)^{1, 4}.
- Brinda inmunidad estéril¹.
- Única vacuna de alto título contra distemper.



Nobivac® Puppy DP PLUS

Una **REVOLUCIÓN** en la protección del cachorro.



Protección temprana
**SIN INTERFERENCIA
DE ANTICUERPOS
MATERNOS**
a partir de las cuatro
semanas de edad¹.



Rápido
**INICIO
DE LA INMUNIDAD
A LOS 3 DÍAS
PARA PARVOVIRUS
CANINO¹.**



La PRIMERA
vacuna basada
**EN LA ÚLTIMA
VARIANTE DE CAMPO
CPV-2c**
de Parvovirus Canino.



**ÚNICA VACUNA
ALTO TÍTULO
CONTRA
DISTEMPER CANINO**



Referencias: 1. Pearce, J. et al. *Vaccines* (2023), 11, 1499. 2. Data on File. Study Report DP PLUS 004 MSD Animal Health. 3. Data on File. Study Report DP PLUS 003 MSD Animal Health. 4. EMEA/V/C/005251/0000