

**Circumvent® C-M-L**

Vacuna de Circovirus Porcino – tipo 2, vector inactivado,  
*Lawsonia intracellularis* bacterina *Mycoplasma hyopneumoniae*

**COMPOSICIÓN:**

Cada dosis de 2 mL contiene: Antígeno de la subunidad ORF2 del Circovirus Porcino Tipo 2  $\geq 1.4$  RP, *Mycoplasma hyopneumoniae* inactivado, cepa 11  $\geq 1.2$  R.P. y *Lawsonia intracellularis* inactivado  $\geq 1.5$  RP. Excipientes c.s.p.1 dosis. **PRESERVANTES:** Gentamicina y Timerosal.

**INDICACIONES:**

Para uso en cerdos sanos de 3 semanas de edad o mayores para la prevención de la enfermedad causada por Circovirus Porcino Tipo 2a y 2d, *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Lawsonia intracellularis*.

**DOSIS:**

Agitar bien. Lleve la vacuna a temperatura ambiente inmediatamente antes de la administración. Utilizar la técnica aséptica, inyectar 2 mL intramuscular (IM) en cerdos de 3 semanas de edad o mayores. Para recomendaciones sobre la frecuencia de revacunación, consulte con su médico veterinario.

**DURACIÓN DE INMUNIDAD:**

PCV Tipo 2d: al menos 16 semanas después de la vacunación. La duración de la inmunidad para PCV Tipo 2a no ha sido establecida. *Mycoplasma hyopneumoniae*: al menos 10 semanas después de la vacunación, *Lawsonia intracellularis*: al menos 20 semanas después de la vacunación.

**ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES:**

Almacenar en la oscuridad entre 2° y 8°C. No congelar. No mezclar con otros productos. Este producto no ha sido probado en animales en periodo de gestación o lactancia. Use el contenido completo una vez abierto.

**PERIODO DE RETIRO:** No vacunar dentro de los 60 días antes del sacrificio. **ADVERTENCIAS:** Un número significativo de cerdos podrían presentar una leve inflamación en el sitio de inyección. La inflamación debe resolverse sin tratamiento en menos de 29 días. Reacciones inmediatas sistémicas se han observado en animales donde se ha administrado el producto. Minimizar la manipulación de cerdos y asegurar la ventilación apropiada antes de iniciar la vacunación. Si una reacción alérgica ocurre, tratar con epinefrina. Use con cuidado para evitar autoinyectarse sus dedos, manos o cualquier parte del cuerpo. La inyección accidental puede causar reacciones locales. En caso de autoinyección en humanos, contacte al médico. Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

**PRESENTACIÓN:**

Contenido neto: 100mL 50 dosis.

**VENTA BAJO RECETA VETERINARIA**

Uso veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

Producto de Intervet Inc., Omaha NE 68103, Estados Unidos

Fabricado por: Intervet Inc., DeSoto KS 66018, Estados Unidos



**Importado y distribuido por:**

Argentina: Intervet Argentina S.A.  
Cazadores de Coquimbo 2841  
(B1605AZE) Munro - Buenos Aires.  
Dir. Téc.: Eduardo V. López,  
Médico Veterinario, MPBA 4505.