
Nobivac® Respira Bb
Suspensión inyectable para perros.

Vacuna subunitaria contra *Bordetella bronchiseptica*

Composición:

Cada dosis contiene: Fimbrias purificadas de *Bordetella bronchiseptica* cepa Bb7 9293: ≥ 88 y ≤ 399 U¹

¹Unidades de masa antigénica por ELISA

Adyuvante: Acetado de dl- α -tocoferol 74,7 mg

Preservante: Tiomersal 0,15mg Excipientes c.s.p 1 mL

Indicaciones de uso:

Para la inmunización activa de perros contra *Bordetella bronchiseptica* a partir de las 6 semanas de edad, para reducir los signos clínicos de enfermedad respiratoria del tracto respiratorio superior y la excreción bacteriana post-infección.

Inicio de la inmunidad: 2 semanas.

Especies de destino:

Caninos.

Dosis, vía de administración y modo de empleo

Administrar una dosis de 1 ml por vía subcutánea.

Deje que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15°C - 25°C) antes de usarla.

Agite bien antes de cada dosis administrada. Evite la introducción de contaminación utilizando material estéril para cada dosis administrada.

Los perros pueden vacunarse a partir de las 6 semanas de edad.

- Vacunación primaria: Dos vacunaciones con un intervalo de 2 a 4 semanas.
- Revacuación: Una única vacunación, administrada 7 meses después de la vacunación primaria con esta vacuna, es suficiente para mantener la protección frente a *Bordetella bronchiseptica* durante un año más.

Posteriormente se debe administrar una única vacunación, anualmente.

En caso de que se omita la revacuación a los 7 meses, una sola vacunación dentro de los 12 meses posteriores a la vacunación primaria es suficiente para extender la protección contra *Bordetella bronchiseptica* por un año más.

Esta vacuna también se puede utilizar para la revacuación en un esquema en el que se haya utilizado Nobivac® KC¹ para la vacunación primaria. Una sola vacuna, administrada un año después de la primovacuna con Nobivac® KC, es suficiente para prolongar la inmunidad contra *Bordetella bronchiseptica* un año más.

¹ SENASA Cert. N°25-189

Para uso asociado:

Cuando esta vacuna se administre en uso asociado (pero no mezclado) con las vacunas Nobivac® DHPPi, SENASA Cert. N°98247; Nobivac® L4, SENASA Cert. N° 15-185 o Nobivac® Rabies SENASA Cert. N° 00-294, estas deben administrarse por vía subcutánea al mismo tiempo, pero en sitios diferentes. Los perros no deben tener menos de la edad mínima recomendada para la otra vacuna Nobivac®, como se indica en los respectivos rotulados.

Contraindicaciones:

Ninguna.

Efectos adversos: inflamación en el punto de inyección (puede estar presente hasta 25 días después de la vacunación).

Advertencias y precauciones especiales de uso: vacunar animales sanos. No mezclar con otro producto veterinario. Puede ser usado durante la gestación y lactancia.

Condiciones de almacenamiento: almacenar entre 2°C y 8°C. No congelar. Proteger de la luz. Una vez abierto utilizar dentro de 4 semanas entre 2°C y 25°C.

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer, Países Bajos

Uso veterinario. Venta bajo receta.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.



Certificado N° 25-189

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,
Méd. Vet. MPBA 4505.