

FICHA TÉCNICA**Porcilis® ILEITIS**

Bacterina para el control de la Ileititis causada por *Lawsonia intracellularis* en cerdos.

Composición:

Cada dosis de 2 ml contiene:

Cultivos inactivados de:

Lawsonia intracellularis, SPAH08... ≥ 1.5 RP*

Vehículo c.b.p..... 2 ml

Adyuvante: Adyuvante Microsol, Adyuvante Fortasol.

Conservadores: Gentamicina y timerosal.

*Potencia Relativa

Indicaciones:

Porcilis Ileititis está recomendada para utilizarse en cerdos sanos de 3 semanas de edad o mayores como auxiliar para controlar la ileititis provocada por *Lawsonia intracellularis*, para reducir la colonización de *Lawsonia*, así como para disminuir la duración de la excreción fecal. Se ha demostrado que la duración de la inmunidad es de por lo menos 20 semanas.

Especie de destino:

Porcinos.

Dosis y vía de administración:

Agite bien. Permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de administrarla. Utilizando una técnica aséptica, inyecte una dosis de 2 ml por vía intramuscular (IM) a cerdos de 3 semanas de edad o mayores.

Período de retiro:

No vacunar durante los 21 días previos al sacrificio.

Advertencias:

Si ocurre una reacción alérgica, tratar al animal con epinefrina. Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.

No se debe administrar a cerdas gestantes ni en lactación.

Una vez abierto el envase, utilice todo su contenido; no conserve ningún contenido restante. Incinere el envase y todo el producto no utilizado.

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con cualquier otro medicamento de uso veterinario. Por lo tanto, la decisión de usar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario se debe tomar dependiendo de cada caso.

Se debe tener cuidado para evitar inyectarse, una inyección accidental puede provocar reacciones locales serias. Consulte a un médico de inmediato.

Condiciones de almacenamiento.

Consérvese en refrigeración entre 2° y 7°C No congelar.

Elaborado en: EE. UU.



Porcilis® ILEITIS
Inyección intramuscular

FICHA TÉCNICA

**Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta oficial archivada.
Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.**

Los envases deben ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.



Certificado N° 20-026

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, Méd. Vet. MPBA 4505.